

Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Естественные и математические науки»

## **ОБЩАЯ ХИМИЯ**

Методические указания к выполнению контрольной работы  
для студентов направления

18.03.01 «Химическая технология»

заочной формы обучения

**Энгельс 2024**

# Общая и неорганическая ХИМИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                          | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Общие методические указания                                              | 3    |
| Программа                                                                | 5    |
| Литература                                                               | 7    |
| Контрольные задания                                                      | 11   |
| <b>Контрольное задание 1</b>                                             | 18   |
| Эквиваленты простых и сложных веществ. Закон эквивалентов                | 18   |
| Строение атомов                                                          | 22   |
| Периодическая система элементов Д. И. Менделеева                         | 23   |
| Химическая связь и строение молекул. Конденсированное состояние вещества | 24   |
| Энергетика химических процессов (термохимические расчеты)                | 27   |
| Химическое сродство                                                      | 34   |
| Химическая кинетика и равновесие                                         | 40   |
| Способы выражения концентрации раствора                                  | 45   |
| Свойства растворов                                                       | 49   |
| Ионные реакции обмена                                                    | 52   |
| Гидролиз солей                                                           | 55   |
| <b>Контрольное задание 2</b>                                             | 57   |
| Окислительно-восстановительные реакции                                   | 57   |
| Электродные потенциалы и электродвижущие силы                            | 63   |
| Электролиз                                                               | 67   |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Коррозия металлов                                          | 71 |
| Комплексные соединения                                     | 73 |
| s-Элементы (... ns <sup>1-2</sup> )                        | 76 |
| Жесткость воды и методы ее устранения                      | 78 |
| p-Элементы (... ns <sup>2</sup> np <sup>1-6</sup> )        | 80 |
| d-Элементы (... (n-1)d <sup>1-10</sup> ns <sup>0-2</sup> ) | 84 |
| Органические соединения. Полимеры                          | 87 |

## ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Химия является не только общетехнической, но и общеобразовательной наукой. Поэтому инженер любой специальности должен обладать достаточными знаниями в области химии.

С успехами химии и смежных с ней наук связано появление новых источников энергии, создание синтетических материалов, расширение сырьевой базы, развитие пищевой промышленности. Знание химии необходимо не только для понимания основ создания новых материалов и технологических процессов, но и для сохранения здоровья людей. Безответственное отношение к этим вопросам, отсутствие элементарной «химической культуры» уже сегодня пагубно сказывается на окружающей среде и ставит человечество на край экологической пропасти.

Знание курса химии необходимо и для успешного изучения последующих общенаучных и специальных дисциплин. Студенты должны прочно усвоить основные законы и теории химии и овладеть техникой химических расчетов; выработать навыки самостоятельного выполнения химических экспериментов и обобщения наблюдаемых фактов.

Основной вид учебных занятий студентов-заочников – самостоятельная работа над учебным материалом. По курсу химии она складывается из следующих элементов: изучение материала по учебникам и учебным пособиям; выполнение контрольных заданий; выполнение лабораторного практикума; индивидуальные консультации; посещение лекций; сдача экзамена по всему курсу.

**Работа с книгой.** Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием каждой из них по программе. (Расположение материала курса в программе не всегда совпадает с расположением его в учебнике.) Изучая курс, пользуйтесь и предметным указателем в конце книги. При первом чтении не задерживайтесь на математических выводах, составлении уравнений реакций; старайтесь получить общее представление об излагаемых вопросах, а также отмечайте трудные или неясные места. Внимательно прочитайте текст, напечатанный особым шрифтом. При повторном изучении темы усвойте все теоретические

положения, математические зависимости и их выводы, а также принципы составления уравнений реакций. Вникайте в сущность того или иного вопроса, а не пытайтесь запомнить отдельные факты и явления. Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных явлений способствует более глубокому и прочному усвоению материала. Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, надо обязательно иметь рабочую тетрадь и заносить в нее формулировки законов и основных понятий химии, новые незнакомые термины и названия, формулы и уравнения реакций, математические зависимости и их выводы и т. п. Во всех случаях, когда материал поддается систематизации, составляйте графики, схемы, диаграммы, таблицы. Они очень облегчают запоминание и уменьшают объем конспектируемого материала. Пока тот или иной раздел не усвоен, переходить к изучению новых разделов не следует. Краткий конспект курса будет полезен при повторении материала в период подготовки к экзамену. Изучение курса должно обязательно сопровождаться выполнением упражнений и решением задач (см. список рекомендованной литературы). Решение задач – один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического материала.

**Контрольные задания.** В процессе изучения курса химии студент должен выполнить две контрольные работы. К выполнению контрольной работы можно приступить только тогда, когда будет изучена определенная часть курса и тщательно разобраны решения примеров, приведенных перед задачами к соответствующим темам контрольных заданий.

Решение задач и ответы на теоретические вопросы должны быть коротко, но четко обоснованы, за исключением тех случаев, когда по существу вопроса такая мотивировка не требуется, например, когда нужно составить электронную формулу, написать уравнение реакции и т. п.

При решении задач нужно приводить весь ход решения и математические преобразования.

Каждая контрольная работа должна быть аккуратно оформлена; для замечаний рецензента надо оставлять широкие поля; писать четко и ясно; номера и условия задач переписывать в том порядке, в каком они указаны в задании. Работы должны быть датированы, подписаны студентом и представлены в институт на рецензирование.

Если контрольная работа не зачтена, ее нужно выполнить второй раз в соответствии с указаниями рецензента и выслать на повторное рецензирование вместе с не зачтенной работой. Исправления следует выполнять в конце тетради, а не в рецензированном тексте. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не рецензируется и не зачитывается.

**Лабораторные занятия.** Для глубокого изучения химии как науки, основанной на эксперименте, необходимо выполнить лабораторные работы. Студенты выполняют их в период лабораторно-экзаменационной сессии.

**Консультации.** Если у студента возникают затруднения при изучении курса, следует обращаться за консультацией в институт к преподавателю, рецензирующему контрольные работы. Консультации можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим организационно-методическим вопросам.

**Лекции.** В помощь студентам читаются лекции по важнейшим разделам курса. Лекции читаются в период установочной и лабораторно-экзаменационной сессий.

**Экзамен.** К сдаче экзамена допускаются студенты, которые выполнили контрольные задания и лабораторный практикум.

## **ПРОГРАММА**

Содержание курса и объем требований, предъявляемых студенту при сдаче экзамена, определяет программа по химии для инженерно-технических (нехимических) специальностей высших учебных заведений.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Химия как раздел естествознания — наука о веществах и их превращениях. Понятие о материи и веществе. Значение химии в изучении природы и развитии техники. Развитие химии и химической промышленности в России. Специфическая роль химии в технологических и экономических вопросах отрасли народного хозяйства. Основные химические понятия и законы в свете современной материалистической философии.

## **I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА**

1. Строение атомов и систематика химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Атомные ядра, их состав. Изотопы. Электронные оболочки атомов. Характеристика поведения электронов в атомах. Квантовые числа; принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней.

2. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Диалектический характер периодического закона. Периодическое изменение свойств химических элементов. Энергия ионизации и сродство к электрону. Электроотрицательность элементов. Радиусы атомов и ионов. Металлические и неметаллические свойства элементов и элементарных веществ.

3. Химическая связь. Химическая связь и валентность элементов. Методы валентных связей и молекулярных орбиталей. Основные виды химической связи. Полярность связи. Энергия, длина и направленность связи. Строение простейших молекул. Понятие о методах исследования строения молекул.

Окисление и восстановление. Понятие о степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительные и восстановительные свойства элементарных веществ и химических соединений.

4. Типы взаимодействия молекул. Конденсированное состояние вещества. Соединение однородных молекул. Конденсация паров; жидкое состояние; межмолекулярные связи. Полимеризация. Водородная связь. Соединение разнородных молекул. Комплексообразование. Химическая связь в комплексных соединениях (донорно-акцепторная связь).

5. Строение кристаллов. Представление об элементах симметрии и классификации кристаллических форм. Сопоставление структур в кристалле и в газовой фазе. Типы кристаллических решеток. Понятие о методах исследования строения кристаллов. Реальные кристаллы. Свойства веществ в различных состояниях. Зависимость физических свойств от вида химической связи между частицами в кристаллах. Особенности химических свойств поверхности твердых тел.

## **II. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

1. Энергетика химических процессов. Физическая сущность энергетических эффектов химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы. Энтальпия образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Изменение энтальпии в различных процессах. Термохимические расчеты.

2. Химическое сродство. Понятие об энтропии. Изменение энтропии при химических процессах и фазовых переходах. Энергия Гиббса и ее изменение при химических процессах. Энергия Гиббса образования химических соединений. Направленность химических процессов.

3. Химическая кинетика и равновесие в гомогенных системах. Гомогенные и гетерогенные системы. Скорость гомогенных реакций. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. Закон действия масс; константа скорости реакции. Зависимость скорости гомогенных реакций от температуры. Химическое равновесие в гомогенных системах. Константа равновесия. Цепные реакции. Гомогенный катализ. Понятие о фотохимии и радиационной химии.

4. Химическая кинетика и равновесие в гетерогенных системах.

5. Фазовые переходы и равновесия. Скорость гомогенных химических реакций. Химические равновесия в гомогенных системах. Основные факторы, определяющие направление течения реакций и состояние равновесия. Принцип Ле Шателье.

## **III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ**

1. Свойства химических элементов и простых веществ. Химические элементы в периодической системе. Классификация элементов по химической природе. Классификация веществ. Аллотропия; полиморфизм. Физические свойства простых веществ. Химические свойства простых веществ. Периодическое изменение свойств простых веществ.

2. Простые соединения химических элементов. Общий обзор простых соединений элементов и характер химической связи в них. Простые соединения водорода; простые кислоты, гидриды. Соединения галогенов. Соединения кислорода; оксиды и гидроксиды. Сульфиды, нитриды, карбиды.

3. Комплексные соединения. Структура комплексных соединений. Атомы и ионы как комплексообразователи. Различные типы лигандов в комплексных соединениях. Соединения комплексных анионов. Соединения комплексных катионов и нейтральные комплексы. Устойчивость комплексных соединений.

4. Органические соединения. Строение и свойства органических соединений. Природа химической связи в органических соединениях. Изомерия и строение молекул органических соединений. Специфические особенности органических соединений.

5. Классификация органических соединений. Функциональные группы. Углеводороды и галогенопроизводные. Кислород- и азотсодержащие органические соединения. Кремний- и металлоорганические соединения. Продукты промышленной органической химии.

#### **IV. РАСТВОРЫ И ДРУГИЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ**

1. Основные характеристики растворов и других дисперсных систем. Общие понятия о растворах и других дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. Способы выражения состава растворов и других дисперсных систем. Растворимость.

2. Термодинамика растворения и свойства истинных растворов. Изменение энтальпии и энтропии при растворении. Плотность и давление паров растворов. Фазовые превращения в растворах. Законы Рауля. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Общие вопросы физико-химического анализа. Диаграммы состав — свойства.

3. Водные растворы электролитов. Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация, ее причины. Отклонение от законов Рауля и Вант-Гоффа для растворов электролитов. Ход диссоциации в зависимости от характера химических связей в молекулах электролитов; два вида электролитов. Свойства растворов электролитов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации слабых электролитов. Состояние сильных электролитов в растворах. Ионные

реакции и равновесия. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Смещение равновесий в водных растворах электролитов. Гидролиз солей. Теория кислот и оснований. Амфолиты.

4. Твердые растворы. Образование твердых растворов. Виды твердых растворов. Свойства различных твердых растворов.

5. Гетерогенные дисперсные системы. Агрегативная и кинетическая устойчивость гетерогенных дисперсных систем. Образование гетерогенных дисперсных систем. Грубодисперсные системы — суспензии, эмульсии. Структура и электрический заряд коллоидных частиц. Свойства лиофобных и лиофильных коллоидных систем. Седиментация и коагуляция. Образование и свойства гелей.

6. Электродные потенциалы и электродвижущие силы. Гетерогенные окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электродных потенциалах. Гальванические элементы. Строение двойного электрического слоя на границе электрод — раствор.

7. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов. Зависимость электродных потенциалов от природы электродов и растворителей. Измерение электродных потенциалов. Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Концентрационные элементы. Топливные элементы.

8. Электролиз. Сущность электролиза. Последовательность разрядки ионов. Анодное окисление и катодное восстановление. Вторичные процессы при электролизе. Явление перенапряжения. Электролиз с нерастворимым и растворимым анодами. Применение электролиза для проведения процессов окисления и восстановления. Законы Фарадея. Выход по току. Электролитическое получение и рафинирование металлов. Электролиз расплавов. Основы гальванических методов нанесения металлических покрытий. Аккумуляторы.

9. Коррозия металлов. Основные виды коррозии. Классификация коррозионных процессов. Электрохимическая коррозия металлов. Методы защиты металлов от коррозии. Вопросы экономики, связанные с коррозией металлов.

## **V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ**

### **Для инженеров-механиков**

1. Свойства металлов и сплавов. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов, их восстановительная способность. Взаимодействия различных металлов. Физико-химический анализ металлических сплавов. Интерметаллические соединения и твердые растворы металлов. Использование металлических сплавов и покрытий в технике.

2. Получение металлов. Распространение и формы нахождения металлических элементов в природе. Извлечение металлов из руд. Основные методы восстановления металлов. Получение чистых и сверхчистых металлов. Электролитическое рафинирование. Зонная плавка. Вопросы экономики, связанные с получением металлов.

3. Легкие конструкционные металлы. Проблема легких металлических материалов. Магний, бериллий, алюминий, титан. Особенности их свойств, нахождение в природе, выделение в свободном виде и в виде соединений. Использование магния, бериллия, алюминия, титана в технике. Вопросы экономики, связанные с выделением и применением легких металлов.

4. Тяжелые конструкционные металлы. Ванадий, хром, марганец. Особенности их свойств и свойств их соединений. Нахождение в природе, выделение в свободном виде и в виде соединений, использование в технике. Железо, кобальт, никель, медь. Особенности их свойств; окислительно-восстановительные свойства соединений металлов. Нахождение в природе, выделение в свободном виде и использование в технике. Вопросы экономики, связанные с выделением и применением. Цинк, галлий, олово, свинец. Особенности их свойств, нахождение в природе, выделение в свободном виде и использование в технике.

5. Инструментальные и абразивные материалы. Бор; бориды. Углерод и его аллотропные формы - алмаз, графит. Карбиды, их классификация; карбиды кальция, титана, вольфрама, железа, кобальта, кремния.

6. Полупроводниковые материалы. Кремний, германий, сурьма их свойства и соединения. Получение и использование кремния и германия,

7. Полимерные материалы. Понятие об органических полимерах. Методы синтеза органических полимеров. Особенности внутреннего строения и физико-химические свойства полимеров. Конструкционные пластические массы. Полимерные покрытия и клеи. Неорганические полимеры.

**Вниманию студентов.** Международная система единиц измерения (СИ) состоит из шести основных единиц: метр (м) – длина, килограмм (кг) – масса, секунда (с) – время, ампер (А) – сила тока, кельвин (К) – термодинамическая температура, кандела (кд) – сила света. XIV Генеральная конференция по мерам и весам (1971 г.) утвердила единицу количества вещества моль (моль) в качестве седьмой основной единицы Международной системы: «Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же формульных единиц, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля формульные единицы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц».

Моль вещества соответствует числу Авогадро  $N_A = (6,022045 \pm 0,000031) \cdot 10^{23}$  моль<sup>-1</sup> формульных единиц. При применении понятия «моль» следует указывать, какие формульные единицы имеются в виду. Например, моль атомов Н, моль молекул Н<sub>2</sub>, моль протонов, моль электронов и т.п. Так, заряд моля электронов равен  $6,022 \cdot 10^{23} \cdot e$  и отвечает количеству электричества, равного 1 фарадею (F).

Таблица вариантов контрольных заданий

| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                | I<br>II                                | 1, 21, 31, 51, 61, 81, 101, 111, 121, 141, 151, 171, 191, 211, 241, 261<br>271, 277, 281, 291, 321, 341, 351, 368, 341, 393, 403, 418, 438, 448, 477, 517      |
| 02                | I<br>II                                | 2, 22, 32, 52, 82, 102, 112, 122, 142, 152, 172, 182, 202, 212, 242, 262<br>270, 280, 286, 292, 326, 336, 352, 372, 394, 404, 420, 442, 458, 479, 510, 518     |
| 03                | I<br>II                                | 3, 23, 33, 53, 83, 103, 113, 123, 143, 163, 193, 213, 223, 233, 243, 263<br>266, 273, 283, 293, 318, 328, 353, 383, 395, 403, 418, 340, 450, 478, 493, 519     |
| 04                | I<br>II                                | 4, 24, 34, 54, 84, 104, 114, 124, 144, 154, 164, 184, 204, 214, 234, 254<br>264, 284, 294, 284, 324, 334, 344, 374, 396, 405, 424, 438, 448, 480, 418, 520     |
| 05                | I<br>II                                | 5, 25, 35, 65, 85, 105, 115, 125, 145, 165, 185, 195, 215, 225, 235, 255<br>265, 275, 285, 295, 305, 325, 345, 375, 395, 415, 425, 445, 455, 485, 495, 525     |
| 06                | I<br>II                                | 6, 26, 46, 66, 86, 106, 116, 126, 146, 156, 166, 186, 206, 216, 226, 236<br>266, 276, 286, 296, 306, 326, 346, 368, 396, 406, 416, 426, 436, 456, 476, 526     |
| 07                | I<br>II                                | 7, 17, 27, 47, 67, 87, 97, 107, 127, 147, 157, 167, 197, 217, 227, 237<br>267, 277, 287, 307, 327, 347, 367, 377, 397, 407, 427, 439, 457, 477, 487, 527       |
| 08                | I<br>II                                | 8, 18, 28, 68, 88, 98, 108, 128, 148, 158, 168, 198, 218, 228, 238, 238<br>268, 278, 288, 308, 328, 348, 368, 398, 408, 428, 438, 448, 478, 488, 498, 518      |
| 09                | I<br>II                                | 9, 19, 29, 69, 89, 99, 109, 129, 149, 159, 169, 199, 209, 219, 239, 249<br>269, 279, 280, 289, 309, 329, 349, 369, 399, 409, 419, 439, 449, 479, 499, 519      |
| 10                | I<br>II                                | 10, 20, 40, 70, 90, 100, 110, 130, 140, 150, 170, 190, 200, 210, 230, 250<br>270, 280, 290, 310, 320, 330, 350, 360, 370, 400, 410, 420, 440, 450, 480, 523    |
| 11                | I<br>II                                | 11, 21, 41, 71, 91, 101, 111, 131, 151, 171, 181, 191, 201, 211, 231, 251<br>271, 281, 291, 311, 331, 351, 361, 371, 401, 411, 421, 441, 451, 461, 481, 521    |
| 12                | I<br>II                                | 12, 22, 42, 72, 92, 112, 132, 152, 262, 172, 182, 192, 201, 212, 232, 252<br>262, 272, 282, 292, 312, 332, 352, 372, 402, 422, 442, 452, 462, 472, 492, 522    |
| 13                | I<br>II                                | 13, 23, 43, 73, 93, 113, 133, 143, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 233, 253<br>265, , 273, 284, 293, 313, 333, 353, 373, 403, 423, 443, 453, 483, 493, 512, 523, |

|    |         |                                                                                                                                                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | I<br>II | 14, 24, 44, 74, 94, 114, 134, 154, 164, 174, 184, 194, 204, 214, 244, 254<br>264, 274, 284, 294, 314, 334, 354, 374, 404, 424, 444, 454, 564, 484, 494, 514 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                | I<br>II                                | 15, 25, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 145, 155, 175, 195, 215, 225, 235, 255<br>265, 275, 285, 295, 315, 335, 355, 375, 405, 425, 445, 455, 475, 485, 495, 525  |
| 16                | I<br>II                                | 16, 26, 56, 76, 96, 116, 136, 146, 156, 176, 196, 216, 226, 236, 246, 256<br>266, 276, 286, 296, 316, 336, 356, 376, 406, 426, 446, 456, 486, 496, 516, 526 |
| 17                | I<br>II                                | 7, 17, 37, 57, 77, 97, 107, 127, 137, 157, 177, 197, 217, 227, 237, 257<br>267, 277, 287, 297, 317, 337, 357, 377, 407, 427, 447, 457, 487, 497, 507, 517   |
| 18                | I<br>II                                | 8, 18, 38, 58, 78, 98, 108, 118, 128, 158, 178, 198, 218, 228, 238, 258<br>268, 278, 288, 298, 318, 338, 358, 378, 408, 428, 448, 458, 478, 498, 508, 528   |
| 19                | I<br>II                                | 9, 19, 29, 59, 79, 99, 109, 119, 139, 159, 179, 189, 199, 219, 229, 239,<br>269, 279, 289, 299, 319, 339, 359, 379, 409, 429, 449, 469, 489, 599, 509, 519  |
| 20                | I<br>II                                | 10, 25, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 225, 240, 245<br>270, 280, 290, 300, 320, 340, 360, 380, 410, 430, 450, 460, 480, 490, 500, 520 |
| 21                | I<br>II                                | 1, 22, 43, 64, 85, 106, 116, 127, 148, 156, 169, 192, 211, 222, 236, 256<br>272, 283, 294, 285, 306, 327, 348, 381, 391, 412, 433, 453, 463, 483, 503, 523  |
| 22                | I<br>II                                | 2, 23, 44, 65, 71, 86, 97, 107, 128, 149, 152, 170, 191, 212, 232, 252<br>273, 284, 294, 304, 307, 328, 349, 382, 392, 413, 434, 444, 464, 484, 504, 524    |
| 23                | I<br>II                                | 3, 24, 48, 66, 87, 108, 115, 129, 150, 171, 192, 213, 223, 238, 248, 258<br>264, 275, 286, 297, 308, 329, 350, 383, 393, 414, 435, 445, 465, 485, 505, 525  |
| 24                | I<br>II                                | 4, 25, 47, 57, 77, 98, 109, 130, 151, 172, 193, 214, 224, 237, 247, 257<br>265, 276, 287, 298, 309, 330, 351, 384, 394, 415, 436, 456, 486, 496, 506, 526   |
| 25                | I<br>II                                | 5, 26, 48, 68, 89, 101, 110, 121, 138, 152, 173, 188, 194, 215, 235, 245<br>266, 277, 288, 299, 310, 331, 352, 385, 395, 416, 437, 457, 477, 497, 507, 527  |
| 26                | I<br>II                                | 6, 27, 48, 69, 90, 111, 115, 132, 153, 174, 195, 216, 226, 236, 246, 156<br>227, 248, 269, 290, 311, 332, 353, 386, 396, 417, 438, 458, 488, 498, 508, 518  |
| 27                | I<br>II                                | 7, 18, 49, 70, 91, 102, 112, 133, 144, 154, 175, 196, 217, 227, 237, 257<br>268, 279, 280, 291, 312, 333, 354, 387, 397, 418, 439, 459, 469, 499, 509, 519  |
| 28                | I<br>II                                | 8, 19, 50, 71, 92, 103, 113, 134, 155, 165, 176, 217, 228, 238, 249, 259<br>269, 270, 281, 292, 313, 334, 355, 388, 398, 419, 440, 460, 470, 490, 500, 530  |
| 29                | I<br>II                                | 9, 13, 51, 72, 83, 93, 114, 135, 156, 177, 188, 198, 219, 239, 249, 253<br>270, 281, 292, 300, 314, 335, 356, 389, 399, 420, 441, 451, 461, 481, 491, 521   |

| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                | I<br>II                                | 10, 31, 45, 52, 73, 94, 115, 126, 136, 157, 178, 199, 220, 231, 242, 252, 271, 282, 289, 294, 315, 336, 357, 390, 400, 421, 438, 442, 462, 492, 502, 522  |
| 31                | I<br>II                                | 11, 32, 53, 63, 74, 95, 103, 116, 137, 158, 163, 179, 200, 201, 241, 251, 266, 273, 284, 295, 316, 337, 358, 361, 401, 422, 443, 463, 483, 493, 513, 523  |
| 32                | I<br>II                                | 12, 33, 43, 54, 75, 83, 96, 117, 138, 159, 169, 180, 181, 202, 239, 259, 265, 275, 285, 296, 317, 338, 359, 362, 402, 423, 444, 464, 484, 494, 503, 524   |
| 33                | I<br>II                                | 13, 34, 45, 55, 76, 85, 97, 118, 139, 150, 160, 161, 182, 203, 233, 253, 269, 275, 278, 297, 318, 339, 360, 393, 403, 424, 445, 465, 485, 496, 505, 525   |
| 34                | I<br>II                                | 14, 24, 35, 56, 77, 84, 98, 119, 140, 141, 162, 183, 204, 214, 234, 254, 265, 276, 287, 298, 319, 340, 347, 364, 404, 425, 446, 466, 486, 496, 506, 518   |
| 35                | I<br>II                                | 15, 36, 47, 57, 78, 87, 99, 120, 121, 142, 163, 184, 190, 205, 225, 255, 266, 277, 288, 299, 320, 322, 346, 365, 405, 426, 447, 467, 487, 497, 507, 527   |
| 36                | I<br>II                                | 16, 37, 58, 67, 79, 100, 101, 122, 143, 154, 164, 185, 206, 226, 246, 256, 267, 278, 289, 300, 301, 323, 345, 366, 406, 427, 448, 458, 478, 488, 508, 528 |
| 37                | I<br>II                                | 17, 38, 59, 69, 80, 81, 102, 123, 144, 165, 186, 196, 207, 237, 247, 257, 268, 279, 280, 289, 302, 324, 344, 367, 407, 428, 449, 459, 479, 499, 509, 529  |
| 38                | I<br>II                                | 18, 39, 49, 60, 65, 86, 107, 128, 145, 166, 187, 208, 218, 238, 248, 258, 269, 280, 2691, 303, 313, 325, 343, 368, 408, 429, 445, 450, 475, 495, 507, 518 |
| 39                | I<br>II                                | 19, 24, 40, 44, 66, 87, 108, 129, 146, 167, 188, 209, 223, 243, 253, 263, 740, 277, 283, 304, 316, 326, 342, 369, 409, 430, 432, 442, 462, 482, 497, 527  |
| 40                | I<br>II                                | 20, 23, 45, 67, 75, 88, 109, 130, 147, 168, 189, 210, 220, 232, 252, 262, 271, 284, 293, 305, 327, 341, 363, 370, 410, 411, 431, 441, 461, 478, 498, 520  |
| 41                | I<br>II                                | 2, 24, 36, 46, 68, 89, 97, 110, 131, 148, 170, 190, 201, 221, 241, 251, 265, 273, 281, 306, 328, 341, 371, 391, 411, 431, 452, 462, 482, 499, 509, 519    |
| 42                | I<br>II                                | 3, 25, 47, 57, 69, 90, 111, 132, 149, 171, 191, 202, 213, 232, 242, 262, 264, 272, 286, 292, 307, 329, 342, 372, 392, 412, 432, 447, 474, 484, 494, 517   |
| 43                | I<br>II                                | 4, 26, 36, 48, 70, 91, 105, 112, 133, 150, 172, 192, 203, 243, 253, 263, 265, 273, 287, 293, 308, 330, 343, 373, 393, 413, 433, 453, 463, 473, 493, 516   |
| 44                | I<br>II                                | 5, 27, 37, 49, 71, 92, 102, 113, 134, 151, 173, 193, 204, 224, 234, 245, 266, 274, 288, 294, 309, 331, 344, 374, 394, 414, 434, 454, 474, 484, 494, 524   |

| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                | I<br>II                                | 6, 28, 38, 50, 72, 93, 114, 135, 152, 174, 194, 205, 215, 232, 245, 265, 267, 275, 289, 295, 310, 332, 345, 375, 395, 415, 435, 445, 475, 485, 495, 525   |
| 46                | I<br>II                                | 7, 29, 39, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 175, 195, 206, 226, 236, 256, 261, 268, 276, 280, 286, 311, 333, 346, 376, 396, 416, 436, 456, 476, 486, 506, 526   |
| 47                | I<br>II                                | 8, 30, 52, 62, 74, 95, 116, 137, 154, 176, 196, 207, 217, 247, 257, 262, 269, 277, 281, 287, 312, 334, 347, 377, 397, 417, 437, 447, 467, 487, 497, 417   |
| 48                | I<br>II                                | 9, 31, 53, 75, 85, 96, 117, 138, 155, 177, 197, 208, 218, 238, 248, 258, 270, 288, 288, 313, 335, 348, 368, 378, 398, 418, 438, 448, 468, 498, 508, 518   |
| 49                | I<br>II                                | 10, 32, 54, 76, 87, 97, 118, 139, 156, 178, 198, 209, 219, 239, 249, 259, 273, 289, 298, 314, 336, 349, 379, 399, 419, 439, 448, 459, 479, 490, 509, 519  |
| 50                | I<br>II                                | 11, 23, 33, 56, 77, 98, 119, 140, 157, 179, 199, 201, 210, 230, 240, 250, 272, 280, 294, 299, 315, 337, 350, 380, 400, 420, 440, 450, 460, 470, 490, 520  |
| 51                | I<br>II                                | 12, 24, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 180, 200, 211, 221, 231, 251, 261, 275, 285, 291, 316, 321, 341, 351, 381, 401, 411, 433, 443, 363, 473, 393, 523  |
| 52                | I<br>II                                | 13, 25, 35, 57, 79, 100, 103, 121, 159, 169, 182, 212, 222, 242, 252, 262, 276, 286, 292, 317, 325, 352, 382, 402, 412, 432, 442, 462, 472, 482, 502, 522 |
| 53                | I<br>II                                | 14, 26, 36, 58, 80, 85, 104, 123, 160, 161, 183, 213, 223, 243, 253, 263, 277, 287, 293, 318, 324, 353, 383, 403, 413, 431, 441, 451, 471, 481, 491, 521  |
| 54                | I<br>II                                | 15, 21, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184, 214, 221, 244, 254, 259, 264, 278, 294, 319, 323, 354, 384, 404, 414, 434, 444, 464, 474, 484, 504, 524  |
| 55                | I<br>II                                | 16, 38, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185, 215, 225, 235, 245, 255, 267, 275, 279, 295, 320, 322, 355, 385, 405, 415, 435, 445, 455, 465, 485, 525  |
| 56                | I<br>II                                | 17, 33, 41, 51, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186, 206, 216, 226, 246, 256, 268, 276, 280, 296, 301, 321, 356, 386, 406, 416, 436, 446, 466, 476, 486, 518  |
| 57                | I<br>II                                | 7, 18, 40, 42, 61, 81, 97, 102, 127, 144, 165, 187, 217, 227, 247, 257, 269, 277, 281, 297, 302, 326, 357, 387, 407, 417, 437, 447, 457, 477, 497, 517    |
| 58                | I<br>II                                | 8, 19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188, 218, 228, 238, 248, 258, 270, 282, 298, 303, 317, 327, 358, 388, 408, 418, 438, 448, 458, 478, 498, 518   |
| 59                | I<br>II                                | 9, 20, 22, 41, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189, 219, 229, 239, 249, 259, 269, 273, 299, 304, 328, 359, 389, 409, 419, 433, 443, 453, 463, 473, 493, 523   |
| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                               |

|                   |                                        |                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60                | I<br>II                                | 1, 24, 32, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190, 220, 230, 240, 250, 260, 269, 274, 300, 305, 329, 360, 390, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 480, 490, 520   |
| 61                | I<br>II                                | 3, 25, 43, 65, 70, 90, 106, 131, 148, 169, 191, 201, 221, 231, 251, 261, 275, 281, 291, 301, 330, 341, 361, 392, 421, 441, 451, 461, 471, 491, 501, 521   |
| 62                | I<br>II                                | 4, 26, 44, 66, 71, 91, 107, 132, 149, 170, 192, 202, 212, 132, 242, 252, 276, 282, 292, 302, 331, 342, 362, 393, 422, 442, 452, 462, 472, 482, 512, 522   |
| 63                | I<br>II                                | 5, 27, 45, 67, 87, 92, 108, 133, 150, 171, 193, 203, 213, 233, 243, 253, 277, 283, 293, 303, 332, 343, 363, 394, 423, 443, 453, 463, 473, 393, 503, 523   |
| 64                | I<br>II                                | 6, 28, 46, 68, 78, 93, 109, 134, 151, 172, 194, 204, 214, 224, 244, 254, 278, 284, 294, 304, 333, 344, 364, 395, 424, 444, 454, 474, 484, 494, 504, 529   |
| 65                | I<br>II                                | 7, 29, 39, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 173, 195, 205, 215, 225, 245, 255, 279, 285, 295, 305, 334, 345, 365, 396, 425, 445, 455, 465, 475, 485, 495, 520   |
| 66                | I<br>II                                | 8, 30, 48, 70, 85, 95, 111, 136, 153, 174, 196, 206, 216, 236, 246, 256, 265, 280, 286, 306, 325, 335, 346, 366, 397, 426, 446, 466, 476, 496, 506, 526   |
| 67                | I<br>II                                | 9, 31, 49, 71, 96, 102, 112, 137, 154, 175, 197, 207, 217, 237, 247, 257, 267, 287, 307, 336, 347, 367, 398, 427, 437, 446, 466, 476, 486, 497, 507, 527  |
| 68                | I<br>II                                | 10, 32, 40, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 198, 208, 218, 238, 248, 258, 267, 272, 288, 308, 337, 348, 368, 399, 428, 447, 467, 487, 497, 507, 517, 528  |
| 69                | I<br>II                                | 11, 33, 51, 61, 73, 98, 114, 139, 156, 177, 199, 209, 219, 239, 249, 259, 268, 289, 309, 338, 349, 369, 400, 429, 448, 458, 469, 479, 488, 498, 508, 518  |
| 70                | I<br>II                                | 12, 34, 52, 74, 99, 105, 115, 140, 157, 178, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 264, 280, 290, 310, 339, 350, 370, 391, 430, 449, 459, 469, 479, 489, 499, 529 |
| 71                | I<br>II                                | 13, 35, 53, 75, 85, 100, 116, 121, 158, 178, 181, 211, 221, 231, 251, 261, 265, 291, 311, 331, 340, 351, 371, 404, 411, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 530 |
| 72                | I<br>II                                | 14, 36, 54, 76, 86, 98, 117, 122, 159, 180, 182, 212, 222, 242, 252, 262, 266, 292, 312, 321, 331, 352, 372, 401, 412, 431, 441, 451, 471, 481, 491, 521  |
| 73                | I<br>II                                | 15, 37, 55, 77, 85, 95, 118, 123, 160, 162, 183, 213, 223, 233, 243, 263, 267, 277, 293, 313, 322, 353, 373, 402, 413, 432, 442, 452, 462, 482, 492, 522  |
| 74                | I<br>II                                | 16, 38, 56, 78, 84, 94, 119, 124, 142, 161, 184, 214, 224, 234, 244, 254, 268, 278, 294, 314, 323, 354, 374, 403, 414, 433, 443, 453, 463, 473, 503, 523  |
| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                               |
| 75                | I<br>II                                | 17, 29, 39, 57, 79, 83, 100, 120, 125, 141, 163, 185, 215, 235, 245, 255, 269, 295, 315, 324, 355, 375, 406, 415, 434, 441, 451, 471, 481, 491, 505, 521  |
| 76                | I<br>II                                | 18, 40, 58, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186, 216, 226, 236, 246, 256, 270, 280, 296, 316, 325, 335, 356, 376, 407, 416, 435, 445, 455, 465, 485, 522  |

|    |         |                                                                                                                                                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | I<br>II | 19, 23, 53, 39, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 217, 227, 237, 247, 257, 271, 297, 307, 317, 326, 357, 377, 408, 417, 436, 446, 456, 466, 486, 496, 526 |
| 78 | I<br>II | 8, 20, 21, 60, 62, 88, 100, 103, 128, 145, 166, 188, 218, 238, 248, 258, 272, 298, 318, 327, 358, 378, 409, 418, 437, 443, 453, 463, 473, 503, 513, 523  |
| 79 | I<br>II | 4, 22, 31, 51, 63, 99, 104, 129, 139, 146, 167, 189, 219, 239, 249, 259, 273, 283, 300, 319, 328, 349, 359, 379, 410, 419, 438, 448, 468, 498, 508, 528  |
| 80 | I<br>II | 5, 23, 52, 64, 75, 98, 105, 130, 147, 168, 190, 220, 232, 242, 252, 262, 274, 281, 320, 329, 354, 360, 374, 380, 391, 420, 439, 459, 469, 489, 509, 529  |
| 81 | I<br>II | 17, 29, 39, 57, 79, 83, 100, 120, 125, 141, 163, 185, 215, 235, 245, 255, 271, 297, 307, 317, 326, 357, 377, 408, 417, 436, 446, 456, 466, 486, 496, 526 |
| 82 | I<br>II | 1, 24, 32, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190, 220, 230, 240, 250, 260, 277, 283, 293, 303, 332, 343, 363, 394, 423, 443, 453, 463, 473, 393, 503, 523  |
| 83 | I<br>II | 3, 25, 43, 65, 70, 90, 106, 131, 148, 169, 191, 201, 221, 231, 251, 261, 268, 276, 280, 296, 301, 321, 356, 386, 406, 416, 436, 446, 466, 476, 486, 518  |
| 84 | I<br>II | 4, 26, 44, 66, 71, 91, 107, 132, 149, 170, 192, 202, 212, 132, 242, 252, 269, 273, 299, 304, 328, 359, 389, 409, 419, 433, 443, 453, 463, 473, 493, 523  |
| 85 | I<br>II | 6, 28, 46, 68, 78, 93, 109, 134, 151, 172, 194, 204, 214, 224, 244, 254, 267, 275, 279, 295, 320, 322, 355, 385, 405, 415, 435, 445, 455, 465, 485, 525  |
| 86 | I<br>II | 15, 36, 47, 57, 78, 87, 99, 120, 121, 142, 163, 184, 190, 205, 225, 255, 270, 280, 296, 316, 325, 335, 356, 376, 407, 416, 435, 445, 455, 465, 485, 522  |
| 87 | I<br>II | 8, 18, 28, 68, 88, 98, 108, 128, 148, 158, 168, 198, 218, 228, 238, 238, 267, 272, 288, 308, 337, 348, 368, 399, 428, 447, 467, 487, 497, 507, 517, 528  |
| 88 | I<br>II | 10, 32, 40, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 198, 208, 218, 238, 248, 258, 278, 284, 294, 304, 333, 344, 364, 395, 424, 444, 454, 474, 484, 494, 504, 529 |
| 89 | I<br>II | 14, 24, 35, 56, 77, 84, 98, 119, 140, 141, 162, 183, 204, 214, 234, 254, 279, 285, 295, 305, 334, 345, 365, 396, 425, 445, 455, 465, 475, 485, 495, 520  |

| Номер<br>варианта | Номера<br>конт-<br>рольного<br>задания | Номера задач, относящихся к данному заданию                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                | I<br>II                                | 9, 31, 53, 75, 85, 96, 117, 138, 155, 177, 197, 208, 218, 238, 248, 258, 265, 273, 281, 306, 328, 341, 371, 391, 411, 431, 452, 462, 482, 499, 509, 519 |
| 91                | I<br>II                                | 3, 25, 43, 65, 70, 90, 106, 131, 148, 169, 191, 201, 221, 231, 251, 261, 265, 291, 311, 331, 340, 351, 371, 404, 411, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 530 |
| 92                | I<br>II                                | 2, 23, 44, 65, 71, 86, 97, 107, 128, 149, 152, 170, 191, 212, 232, 252, 264, 272, 286, 292, 307, 329, 342, 372, 392, 412, 432, 447, 474, 484, 494, 517  |

|     |         |                                                                                                                                                           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93  | I<br>II | 13, 34, 45, 55, 76, 85, 97, 118, 139, 150, 160, 161, 182, 203, 233, 253, 269, 273, 299, 304, 328, 359, 389, 409, 419, 433, 443, 453, 463, 473, 493, 523   |
| 94  | I<br>II | 4, 26, 36, 48, 70, 91, 105, 112, 133, 150, 172, 192, 203, 243, 253, 263, 272, 280, 294, 299, 315, 337, 350, 380, 400, 420, 440, 450, 460, 474, 490, 524   |
| 95  | I<br>II | 17, 33, 41, 51, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186, 206, 216, 226, 246, 256, 266, 292, 312, 321, 331, 352, 372, 401, 412, 431, 441, 455, 471, 481, 491, 525  |
| 96  | I<br>II | 18, 20, 38, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186, 216, 226, 236, 246, 255, 266, 276, 280, 296, 301, 321, 356, 386, 406, 416, 436, 446, 466, 476, 486, 516  |
| 97  | I<br>II | 17, 35, 53, 75, 85, 100, 116, 121, 158, 178, 187, 211, 221, 231, 257, 261, 277, 287, 293, 303, 332, 343, 363, 394, 427, 443, 453, 463, 473, 393, 503, 527 |
| 98  | I<br>II | 18, 23, 53, 39, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 188, 217, 227, 237, 247, 258, 278, 288, 294, 304, 333, 344, 364, 395, 424, 448, 454, 474, 484, 494, 504, 528  |
| 99  | I<br>II | 93, 25, 43, 65, 70, 90, 109, 131, 149, 169, 191, 201, 221, 231, 251, 259, 279, 289, 295, 305, 334, 345, 369, 396, 425, 445, 455, 469, 475, 485, 499, 519  |
| 100 | I<br>II | 11, 33, 51, 61, 70, 98, 110, 139, 150, 170, 199, 200, 219, 239, 249, 259, 268, 290, 309, 338, 349, 360, 400, 430, 448, 458, 469, 479, 480, 498, 508, 519  |

## КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Каждый студент выполняет вариант контрольных заданий, обозначенный двумя последними цифрами номера студенческого билета (шифра). Например, номер студенческого билета 80–594, две последние цифры – 94, им соответствует вариант контрольного задания 94.

## КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1

### ЭКВИВАЛЕНТЫ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ВЕЩЕСТВ. ЗАКОН ЭКВИВАЛЕНТОВ

**Пример 1.** На восстановление 7,09 г оксида двухвалентного металла требуется 2,24 л водорода, измеренного при н. у. (Нормальные условия: 760 мм рт. ст.=1 атм, или по Международной системе единиц (СИ)  $1,013 \cdot 10^5$  Па, 273 К, или 0°C). Вычислить эквивалент и эквивалентную массу оксида, эквивалент и эквивалентную массу металла. Чему равна атомная масса металла?

**Решение.** По закону эквивалентов массы веществ  $m_1$  и  $m_2$ , вступающих в реакцию, пропорциональны их эквивалентам  $\mathcal{E}_1$  и  $\mathcal{E}_2$ :

$$m_1 / \mathcal{E}_1 = m_2 / \mathcal{E}_2 ; \quad \text{или} \quad m_1 / M_{(э)}1 = m_2 / M_{(э)}2 \quad (1)$$

$$m_{(MeO)} / M_3(MeO) = m_{(H_2)} / M_3(H_2). \quad (2)$$

Если одно из веществ находится в газообразном состоянии, то, как правило, его количество измеряется в объемных единицах ( $\text{см}^3$ , л,  $\text{м}^3$ ).

В (2)  $m_{(\text{H}_2)}/M_3(\text{H}_2)$  отношение заменяем равным ему отношением  $V_{\text{H}_2}/V_3(\text{H}_2)$ , где  $V_{\text{H}_2}$  – объем водорода;  $V_3(\text{H}_2)$  – эквивалентный объем водорода.

$$m_{\text{MeO}}/M_3(\text{MeO}) = V_{\text{H}_2}/V_3(\text{H}_2) \quad (3)$$

Эквивалентная масса водорода (1,008 г) равна половине его молекулярной массе (2,016 г), поэтому согласно следствию из закона Авогадро (при н. у.)

$$V_3(\text{H}_2) = 22,4/2 = 11,2 \text{ л/моль.}$$

Из (3) находим эквивалентную массу оксида металла (MeO):

$$\begin{aligned} 7,09 / M_3(\text{MeO}) &= 2,24 / 11,2; \\ M_3(\text{MeO}) &= 7,09 \cdot 11,02 / 2,24 = 35,45 \text{ г/моль.} \end{aligned}$$

По закону эквивалентов  $M_3(\text{MeO}) = M_3(\text{Me}) + M_3(\text{O})$ , отсюда

$$M_3(\text{Me}) = M_3(\text{MeO}) - M_3(\text{O}) = 35,45 - 8 = 27,45 \text{ г/моль.}$$

Атомную массу металла определяем из соотношения  $M_3 = A/B$ , где  $M_3$  – эквивалентная масса,  $A$  – атомная масса,  $B$  – валентность элемента.

$$A = M_3 \cdot B = 27,45 \cdot 2 = 54,9.$$

**Пример 2.** Сколько металла, эквивалентная масса которого равна 12,16 г/моль, взаимодействует с  $310 \text{ см}^3$  кислорода, измеренного при н. у.?

**Решение.** Молекулярная масса  $\text{O}_2$  (32 г/моль) при н. у. занимает объем 22,4 л/моль, а эквивалентный объем кислорода  $22,4/4 = 5,6$  л/моль. ( $M_3(\text{O}) = 8$  г/моль). По закону эквивалентов:

$$m_{\text{Me}} / M_3(\text{O}) = V(\text{O}_2) / V_3(\text{O}) \text{ или } m_{\text{Me}} / 12,6 = 310 / 5600,$$

откуда

$$m_{\text{Me}} = 12,6 \cdot 310 / 5600 = 0,673 \text{ г.}$$

**Пример 3.** Вычислить эквивалентные массы  $\text{H}_2\text{SO}_4$  и  $\text{Al}(\text{OH})_3$  в реакциях, выраженных уравнениями:



**Решение.** Эквивалентная масса сложного вещества, так же как и эквивалентная масса элемента, может иметь различные значения и зависит от того, в какую реакцию обмена вступает это вещество. Эквивалентная масса кислоты (основания) равна молекулярной массе ( $M$ ), деленной на число

атомов водорода, замещенных в данной реакции на металл (на число вступающих в реакцию гидроксильных групп). Следовательно, эквивалентная масса  $\text{H}_2\text{SO}_4$  в реакции (1) равна  $M(\text{H}_2\text{SO}_4)$ , а в реакции (2) –  $M(\text{H}_2\text{SO}_4)/2$ . Эквивалентная масса  $\text{Al}(\text{OH})_3$  в реакции (3) равна  $M(\text{Al}(\text{OH})_3)$ , а в реакции (4) –  $M(\text{Al}(\text{OH})_3)/3$ .

Задачу можно решить и другим способом. Так как  $\text{H}_2\text{SO}_4$  взаимодействует с одним эквивалентом  $\text{KOH}$  и двумя эквивалентами магния, то ее эквивалент равен в реакции (1)  $M/1$  и в реакции (2)  $M/2$ .  $\text{Al}(\text{OH})_3$  взаимодействует с одним эквивалентом  $\text{HCl}$  и тремя эквивалентами  $\text{HNO}_3$ , поэтому его эквивалент в реакции (3) равен  $M/1$ , в реакции (4)  $M/3$ .

**Пример 4.** Из 3,85 г нитрата металла получено 1,60 г его гидроксида. Вычислить эквивалентную массу металла ( $M_3(\text{Me})$ ).

**Решение.** При решении задачи следует иметь в виду: а) эквивалентная масса гидроксида равна сумме эквивалентных масс металла и гидроксильной группы; б) эквивалентная масса соли равна сумме эквивалентных масс металла и кислотного остатка. Учитывая сказанное, подставляем соответствующие данные в (1) (пример 1):

$$\begin{aligned} 3,85/1,60 &= (M_3(\text{Me}) + M_3(\text{NO}_3^-)) / (M_3(\text{Me}) + M_3(\text{Me}(\text{OH}^-))); \\ 3,85/1,60 &= M_3(\text{Me}) + 62 / M_3(\text{Me}) + 17; \\ M_3(\text{Me}) &= 15 \text{ г/моль} \end{aligned}$$

## КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. При восстановлении водородом 10,17 г оксида двухвалентного металла образовалось 2,25 г воды, эквивалентная масса которой 9,00 г/моль. Вычислите эквивалентную массу оксида и эквивалентную массу металла. Чему равна атомная масса металла?

2. Эквивалентная масса трехвалентного металла равна 9 г/моль. Вычислите атомную массу металла, эквивалентную массу его оксида и процентное содержание кислорода в оксиде.

3. Из 1,35 г оксида металла получается 3,15 г его нитрата. Вычислите эквивалентную массу металла. *Ответ:* 32,5 г/моль.

4. Из 1,3 г гидроксида металла получается 2,85 г сульфата этого же металла. Вычислите эквивалентную массу металла. *Ответ:* 9 г/моль.

5. Оксид трехвалентного элемента содержит 31,58% кислорода. Вычислите эквивалентную массу и атомную массу этого элемента.

6. Один оксид марганца содержит 22,56% кислорода, а другой – 50,50%. Вычислите эквивалентные массы марганца в этих оксидах и составьте их формулы.

7. При сгорании серы в кислороде образовалось 12,8 г  $\text{SO}_2$ . Чему равны эквивалентные массы серы и ее оксида?

8. Вычислите эквивалентные массы  $\text{H}_3\text{PO}_4$  в реакциях образования: а)

гидрофосфата; б) дигидрофосфата; в) ортофосфата.

9. В 2,48 г оксида одновалентного металла содержится 1,84 г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и его оксида.

10. Чему равна эквивалентная масса воды при взаимодействии ее а) с натрием; б) с оксидом натрия. *Ответ:* 18 г/моль; 9 г/моль.

11. При восстановлении 1,2 г оксида металла водородом образовалось 0,27 г воды. Вычислите эквивалентную массу оксида и эквивалентную массу металла.

12. Напишите уравнения реакций  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  с соляной кислотой, при которых образуются следующие соединения железа: а) дигидроксохлорид; б) гидроксодихлорид; в) трихлорид. Вычислите эквивалентные массы  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  в каждой из этих реакций.

13. Избытком едкого кали подействовали на растворы: а) дигидрофосфата калия; б) дигидроксонитрата висмута (+3). Напишите уравнения реакций этих веществ с КОН и определите их эквивалентные массы.

14. Вещество содержит 39,0% серы, эквивалентная масса которой 16,0 г/моль и мышьяк. Вычислите эквивалентную массу и валентность мышьяка, составьте формулу этого вещества.

15. Избытком соляной кислоты подействовали на растворы, а) гидрокарбоната кальция; б) гидроксодихлорида алюминия. Напишите уравнения реакций этих веществ с HCl и определите их эквивалентные массы.

16. При окислении 16,74 г двухвалентного металла образовалось 21,54 г оксида. Вычислите эквивалентные массы металла и его оксида. Чему равна атомная масса металла?

17. При взаимодействии 3,24 г трехвалентного металла с кислотой выделяется 4,03 л водорода, измеренного при н. у. Вычислите эквивалентную массу и атомную массу металла.

18. В оксидах азота на два атома приходится: а) пять; б) четыре; в) один атом кислорода. Вычислите эквивалентные массы азота в оксидах и эквивалентные массы оксидов.

19. Одна и та же масса металла соединяется с 1,591 г галогена и с 70,2 см<sup>3</sup> кислорода, измеренного при н. у. Вычислите эквивалентную массу галогена. *Ответ:* 126,9 г/моль.

20. На нейтрализацию 0,943 г фосфористой кислоты  $\text{H}_3\text{PO}_3$  израсходовано 1,291 г КОН. Вычислите эквивалентную массу кислоты и ее основность. *Ответ:* 41 г/моль; 2.



21. При окислении металла (II) массой 6,4 г получился оксид массой 8 г. При восстановлении этого оксида массой 1,0 г получен металл массой 0,8 г. Отвечают ли эти данные закону постоянства состава: 1) да; 2) нет? Ответ подтвердите расчетом.

22. Определить эквивалентную массу металла, если 0,347 г его вытесняют из воды 0,016 г водорода?

23. На нейтрализацию кислоты массой 10 г израсходован гидроксид бария массой 23,4 г. Какова молярная масса эквивалента кислоты?

24. Вычислите молярную массу эквивалента соли меди (II), если она массой 8 г взаимодействует без остатка с гидроксидом Na массой 4 г.

25. Определите молярные эквивалентные массы солей, вступающих в реакции:



26. Рассчитать эквивалентную массу алюминия, зная, что при растворении 0,045 г алюминия в кислоте выделилось 56 мл водорода, измеренного при н.у.

## СТРОЕНИЕ АТОМОВ

27. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 9 и 28. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

28. Напишите электронные формулы атомов фосфора и ванадия. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

29. Какое максимальное число электронов могут занимать *s*-, *p*-, *d*- и *f*-орбитали данного энергетического уровня? Почему?

30. Напишите электронные формулы атомов марганца и селена. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

31. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4*s* или 3*d*; 5*s* или 4*p*? Почему? Составьте электронную формулу атома элемента с порядковым номером 21.

32. Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 17 и 29. У последнего происходит провал одного 4*s*-электрона на 3*d*-подуровень. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

33. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4*d* или 5*s*; 6*s* или 5*p*? Почему? Составьте электронную формулу атома элемента с порядковым номером 43.

34. Какую высшую степень окисления проявляют германий, сурьма, хром, марганец? Составьте формулы оксидов данных элементов, отвечающих этой степени окисления? Ответ мотивировать, опираясь на строение внешнего электронного слоя элементов.

**35.** Внешние уровни атомов имеют вид:  $2s^2 2p^1$ ,  $4s^2 4p^2$ ,  $5s^2 5p^4$ ,  $6s^1$ . В каких периодах и в каких подгруппах находятся эти элементы? К каким электронным семействам они принадлежат?

**36.** Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 14 и 40. Какие электроны этих атомов являются валентными?

**37.** Укажите квантовые числа ( $n$ ,  $l$ ,  $m$ ,  $m_s$ ) электрона, который является последним по порядку заполнения, и определите число неспаренных электронов в атоме элемента пятого периода седьмой группы главной подгруппы.

**38.** Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 16 и 28. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

**39.** Пользуясь правилом Гунда, распределите электроны по орбиталям, отвечающим низшему энергетическому состоянию атомов: марганца, азота, кислорода, кремния, кобальта.

**40.** Сколько и какие значения может принимать магнитное квантовое число  $m_l$  при орбитальном квантовом числе  $l = 0; 1; 2$  и  $3$ ? Какие элементы в периодической системе носят название  $s$ -,  $p$ -,  $d$ -,  $f$ -элементов? Приведите примеры.

**41.** Какие значения могут принимать квантовые числа  $n$ ,  $l$ ,  $m_l$  и  $m_s$ , характеризующие состояние электронов в атоме. Какие значения они принимают для внешних электронов атома магния?

**42.** Чем отличается последовательность в заполнении атомных орбиталей у атомов  $d$ -элементов от последовательности заполнения их у атомов  $s$ - и  $p$ -элементов? Составьте электронную формулу атома элемента с порядковым номером 46, учитывая, что, находясь в пятом периоде, атомы этого элемента на пятом энергетическом уровне не содержат ни одного электрона.

**43.** Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 24 и 33, учитывая, что у первого происходит провал одного  $4s$ -электрона на  $3d$ -подуровень. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

**44.** Значения какого квантового числа определяют число  $s$ -,  $p$ -,  $d$ - и  $f$ -орбиталей на энергетическом уровне? Сколько всего  $s$ -,  $p$ - и  $d$ -электронов в атоме кобальта?

**45.** В чем заключается принцип несовместимости Паули? Может ли быть на каком-нибудь подуровне атома  $p^7$ - или  $d^{12}$ - электронов? Почему? Составьте электронную формулу атома элемента с порядковым номером 22 и укажите его валентные электроны.

**46.** Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 32 и 42, учитывая, что у последнего происходит провал одного  $5s$ -электрона на  $4d$ -подуровень. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?

## ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

47. Исходя из положения германия, цезия и технеция в периодической системе составьте формулы следующих соединений: мета- и ортогерманиевой кислот, дигидрофосфата цезия и оксида технеция, отвечающего его высшей степени окисления. Изобразите графически формулы этих соединений.

48. Что такое энергия ионизации? В каких единицах она выражается? Как изменяется восстановительная активность *s*- и *p*-элементов в группах периодической системы с увеличением порядкового номера? Почему?

49. Что такое электроотрицательность? Как изменяется электроотрицательность *p*-элементов в периоде; в группе периодической системы с увеличением порядкового номера?

50. Исходя из положения германия, молибдена и рения в периодической системе составьте формулы следующих соединений: водородного соединения германия, рениевой кислоты и оксида молибдена, отвечающего его высшей степени окисления. Изобразите графически формулы этих соединений.

51. Что такое сродство к электрону? В каких единицах оно выражается? Как изменяется окислительная активность неметаллов в периоде и в группе периодической системы с увеличением порядкового номера? Ответ мотивируйте строением атома соответствующего элемента.

52. Составьте формулы оксидов и гидроксидов элементов третьего периода периодической системы, отвечающих их высшей степени окисления. Как изменяется химический характер этих соединений при переходе от натрия к хлору?

53. Какой из элементов четвертого периода – ванадий или мышьяк – обладает более выраженными металлическими свойствами? Какой из этих элементов образует газообразное соединение с водородом? Ответ мотивируйте исходя из строения атомов данных элементов.

54. Какие элементы образуют газообразные соединения с водородом? В каких группах периодической системы находятся эти элементы? Составьте формулы водородных и кислородных соединений хлора, теллура и сурьмы, отвечающих их низшей и высшей степеням окисления.

55. У какого элемента четвертого периода – хрома или селена – сильнее выражены металлические свойства? Какой из этих элементов образует газообразное соединение с водородом? Ответ мотивируйте строением атомов хрома и селена.

56. Какую низшую степень окисления проявляют хлор, сера, азот и углерод? Почему? Составьте формулы соединений алюминия с данными элементами в этой их степени окисления. Как называются соответствующие соединения?

**57.** У какого из *p*-элементов пятой группы периодической системы – фосфора или сурьмы – сильнее выражены неметаллические свойства? Какой из водородных соединений данных элементов более сильный восстановитель? Ответ мотивируйте строением атома этих элементов.

**58.** Исходя из положения металла в периодической системе дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидроксидов более сильное основание:  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  или  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ;  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  или  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ;  $\text{Cd}(\text{OH})_2$  или  $\text{Sr}(\text{OH})_2$ ?

**59.** Почему марганец проявляет металлические свойства, а хлор — неметаллические? Ответ мотивируйте строением атомов этих элементов. Напишите формулы оксидов и гидроксидов хлора и марганца.

**60.** Какую низшую степень окисления проявляют водород, фтор, сера и азот? Почему? Составьте формулы соединений кальция с данными элементами в этой их степени окисления. Как называются соответствующие соединения?

**61.** Какую низшую и высшую степень окисления проявляют кремний, мышьяк, селен и хлор? Почему? Составьте формулы соединений данных элементов, отвечающих этим степеням окисления.

**62.** К какому семейству относятся элементы, в атомах которых последний электрон поступает на  $4f$ - и на  $5f$ -орбитали? Сколько элементов включает каждое из этих семейств? Как отражается на свойствах этих элементов электронное строение их атомов?

**63.** Атомные массы элементов в периодической системе непрерывно увеличиваются, тогда как свойства простых тел изменяются периодически. Чем это можно объяснить?

**64.** Какова современная формулировка периодического закона? Объясните, почему в периодической системе элементов аргон, кобальт, теллур и торий помещены соответственно перед калием, никелем, йодом и протактинием, хотя и имеют большую атомную массу?

**65.** Какую низшую и высшую степень окисления проявляют углерод, фосфор, сера и йод? Почему? Составьте формулы соединений данных элементов, отвечающих этим степеням окисления.

**66.** Какую высшую степень окисления могут проявлять германий, ванадий, марганец и ксенон? Почему? Составьте формулы оксидов данных элементов, отвечающих этой степени окисления.

**67.** Приведите современную формулировку периодического закона Д.И.Менделеева. Почему  $\text{Li}$ ,  $\text{Na}$ ,  $\text{K}$ ,  $\text{Rb}$ ,  $\text{Cs}$ ,  $\text{Fr}$  составляют первую главную подгруппу, а  $\text{C}$ ,  $\text{Si}$ ,  $\text{Ge}$ ,  $\text{Sn}$ ,  $\text{Pb}$  четвертую главную подгруппу элементов? Ответ мотивируйте строением внешних энергетических уровней атомов соответствующих элементов.

**68.** Исходя из закономерностей периодической системы, дайте мотивированный ответ на вопрос. Какой из двух гидроксидов более сильное основание:  $\text{NaOH}$  или  $\text{RbOH}$ ;  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  или  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ;  $\text{Zn}(\text{OH})_2$  или  $\text{Sr}(\text{OH})_2$ ?

**69.** Как влияет повышение степени окисления элемента на свойства образованных им оксидов и гидроксидов? Исходя из этого, объясните, как меняются химические свойства оксидов  $\text{MnO}$ ,  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  и гидроксидов  $\text{Mn}(\text{OH})_2$ ,  $\text{Mn}(\text{OH})_4$ ,  $\text{HMnO}_4$ ?

**70.** Распределите электроны атома серы по квантовым ячейкам. Сколько неспаренных электронов у атома серы в нормальном и возбужденном состояниях? Как можно объяснить наличие у серы четной переменной валентности?

**71.** Распределите электроны атома хлора по квантовым ячейкам. Сколько неспаренных электронов у его атома в нормальном и возбужденном состояниях? Как можно объяснить наличие у хлора нечетной переменной валентности?

**72.** Распределите электроны атомов азота и фосфора по квантовым ячейкам. Объясните, почему с точки зрения учения о валентности для азота пятивалентное состояние невозможно, а для фосфора – возможно?

### **ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ. КОНДЕНСИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА.**

**73.** Какую химическую связь называют ковалентной? Чем можно объяснить направленность ковалентной связи? Как метод валентных связей (ВС) объясняет строение молекулы воды?

**74.** Какая ковалентная связь называется неполярной и какая полярной? Что служит количественной мерой полярности ковалентной связи? Составьте электронные схемы строения молекул  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HI}$ . Какие из них являются диполями?

**75.** Какой способ образования ковалентной связи называется донорно-акцепторным? Какие химические связи имеются в ионах  $\text{NH}_4^+$  и  $\text{BF}_4^-$ ? Укажите донор и акцептор.

**76.** Как метод валентных связей (ВС) объясняет линейное строение молекулы  $\text{BeCl}_2$  и тетраэдрическое –  $\text{CH}_4$ ?

**77.** Какая ковалентная связь называется  $\sigma$ -связью и какая  $\pi$ -связью? Разберите на примере строения молекулы азота.

**78.** Сколько неспаренных электронов имеет атом хлора в нормальном и возбужденном состояниях? Распределите эти электроны по квантовым ячейкам. Чему равна валентность хлора, обусловленная неспаренными электронами?

**79.** Распределите электроны атома серы по квантовым ячейкам. Сколько неспаренных электронов имеют ее атомы в нормальном и возбужденном состояниях? Чему равна валентность серы, обусловленная неспаренными электронами?

**80.** Что называется дипольным моментом? Какая из молекул  $\text{HCl}$ ,  $\text{HBr}$ ,  $\text{HI}$  имеет наибольший дипольный момент? Почему?

**81.** Какие кристаллические структуры называются ионными,

атомными, молекулярными и металлическими? Кристаллы каких веществ: алмаз, хлорид натрия, диоксид углерода, цинк – имеют указанные структуры?

**82.** Составьте электронные схемы строения молекул  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CCl}_4$ . В каких молекулах ковалентная связь является полярной? Как метод валентных связей (ВС) объясняет угловое строение молекулы  $\text{H}_2\text{S}$ ?

**83.** Чем отличается структура кристаллов  $\text{NaCl}$  от структуры кристаллов натрия? Какой вид связи осуществляется в этих кристаллах? Какие кристаллические решетки имеют натрий и  $\text{NaCl}$ ? Чему равно координационное число натрия в этих решетках?

**84.** Какая химическая связь называется водородной? Между молекулами каких веществ она образуется? Почему  $\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{HF}$ , имея меньшую молекулярную массу, плавятся и кипят при более высоких температурах, чем их аналоги?

**85.** Какая химическая связь называется ионной? Каков механизм ее образования? Какие свойства ионной связи отличают ее от ковалентной? Приведите два примера типичных ионных соединений. Напишите уравнения превращения соответствующих ионов в нейтральные атомы.

**86.** Что следует понимать под степенью окисления атома? Определите степень окисления атома углерода и его валентность, обусловленную числом неспаренных электронов в соединениях  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{OH}$ ,  $\text{HCOOH}$ ,  $\text{CO}_2$ .

**87.** Какие силы молекулярного взаимодействия называются ориентационными, индукционными и дисперсионными? Когда они возникают и какова природа этих сил?

**88.** Какая химическая связь называется координационной или донорно-акцепторной? Разберите строение комплекса  $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ . Укажите донор и акцептор. Как метод валентных связей (ВС) объясняет тетраэдрическое строение этого иона?

**89.** Какие электроны атома бора участвуют в образовании ковалентных связей? Как метод валентных связей (ВС) объясняет симметричную треугольную форму молекулы  $\text{BF}_3$ ?

**90.** Как метод молекулярных орбиталей объясняет парамагнитные свойства молекулы кислорода? Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы  $\text{O}_2$  в методе молекулярных орбиталей (МО).

**91.** Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы  $\text{F}_2$  в методе МО. Сколько электронов находится на связывающих и разрыхляющих орбиталях?

**92.** Как метод молекулярных орбиталей объясняет большую энергию диссоциации молекулы азота? Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы  $\text{N}_2$  в методе МО. Сколько электронов находится на связывающих и разрыхляющих орбиталях?

## ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ)

(При решении задач этого раздела см. табл. 1)

Наука о взаимных превращениях различных видов энергии называется термодинамикой. Термодинамика устанавливает законы этих превращений, а также направление самопроизвольного течения различных процессов в данных условиях. При химических реакциях происходят глубокие качественные изменения в системе, рвутся связи в исходных веществах и возникают новые связи в конечных продуктах. Эти изменения сопровождаются поглощением или выделением энергии. В большинстве случаев этой энергией является теплота. Раздел термодинамики, изучающий тепловые эффекты химических реакций, называется термохимией.

Реакции, которые сопровождаются выделением теплоты, называются экзотермическими, а те, которые сопровождаются поглощением теплоты, – эндотермическими. Теплоты реакций являются, таким образом, мерой изменения свойств системы, и знание их может иметь большое значение при определении условий протекания тех или иных реакций.

При любом процессе соблюдается закон сохранения энергии как проявление более общего закона природы – закона сохранения материи. Теплота ( $Q$ ), поглощенная системой, идет на изменение ее внутренней энергии ( $\Delta U$ ) и на совершение работы ( $A$ ):

$$Q = \Delta U + A.$$

Внутренняя энергия системы  $U$  – это общий ее запас, включающий энергию поступательного и вращательного движения молекул, энергию внутримолекулярных колебаний атомов и атомных групп, энергию движения электронов, внутриядерную энергию и т. д.

Внутренняя энергия – это полная энергия системы без потенциальной энергии, обусловленной положением системы в пространстве и без кинетической энергии системы как целого. Абсолютное значение  $U$  веществ неизвестно, так как нельзя привести систему в состояние, лишенное энергии. Внутренняя энергия, как и любой вид энергии, является **функцией состояния**, т. е. ее изменение однозначно определяется начальным и конечным состоянием системы и не зависит от пути перехода, по которому протекает процесс  $\Delta U = U_2 - U_1$  где  $\Delta U$  – изменение внутренней энергии системы при переходе от начального состояния ( $U_1$ ) в конечное ( $U_2$ ).

Если  $U_2 > U_1$  то  $\Delta U > 0$ .

Если  $U_2 < U_1$ , то  $\Delta U < 0$ .

Теплота и работа функциями состояния не являются, ибо они служат формами передачи энергии и связаны с процессом, а не с состоянием системы. При химических реакциях  $A$  – это работа против внешнего давления, т. е. в первом приближении  $A = p\Delta V$ , где  $\Delta V$  – изменение объема

системы ( $V_2 - V_1$ ). Так как большинство химических реакций проводят при постоянном давлении, то для изобарно – изотермического процесса ( $p = \text{const}$ ,  $T = \text{const}$ ) теплота  $Q_p$  будет равна:

$$\begin{aligned} Q_p &= \Delta U + p\Delta V; \\ Q_p &= (U_2 - U_1) + p(V_2 - V_1); \\ Q_p &= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1). \end{aligned}$$

Сумму  $U + pV$  обозначим через  $H$ , тогда

$$Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H.$$

Величину  $H$  называют энтальпией. Таким образом, теплота при  $p = \text{const}$  и  $T = \text{const}$  приобретает свойство функции состояния и не зависит от пути, по которому протекает процесс. Отсюда теплота реакции в изобарно-изотермическом процессе  $Q_p$  равна изменению энтальпии системы  $\Delta H$  (если единственным видом работы является работа расширения).  $Q_p = \Delta H$ .

Энтальпия ( $H$ ), как и внутренняя энергия ( $U$ ), является функцией состояния, ее изменение ( $\Delta H$ ) определяется только начальными и конечными состояниями системы и не зависит от пути перехода. Нетрудно видеть, что теплота реакции в изохорно-изотермическом процессе ( $Q_v$ ) ( $V = \text{const}$ ;  $T = \text{const}$ ), при котором  $\Delta V = 0$ , равна изменению внутренней энергии системы  $\Delta U$ ,  $Q_v = \Delta U$ . Теплоты химических процессов, протекающих при  $p$ ,  $T = \text{const}$  и  $V$ ,  $T = \text{const}$ , называют **тепловыми эффектами**.

При экзотермических реакциях энтальпия системы уменьшается и  $\Delta H < 0$  ( $H_2 < H_1$ ), а при эндотермических энтальпия системы увеличивается и  $\Delta H > 0$  ( $H_2 > H_1$ ). В дальнейшем тепловые эффекты всюду выражаются через  $\Delta H$ . В основе термохимических расчетов лежит закон Гесса (1840): «Тепловой эффект реакции зависит только от природы и физического состояния исходных веществ и конечных продуктов, но не зависит от пути перехода». Часто в термохимических расчетах применяют следствие из закона Гесса: «Тепловой эффект реакции ( $\Delta H_{x.p.}$ ) равен сумме теплот образования ( $\Delta H_{\text{обр}}$ ) продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных веществ, с учетом коэффициентов перед формулами этих веществ в уравнении реакции»:


$$\Delta H_{x.p.} = \sum \Delta H^{\text{прод}}_{\text{обр}} - \sum \Delta H^{\text{исх}}_{\text{обр}}$$

**Пример 1.** При взаимодействии кристаллов хлорида фосфора (+5) с парами воды образуются жидкий хлороксид  $\text{POCl}_3$  и хлористый водород. Реакция сопровождается выделением 111,4 кДж теплоты. Напишите термохимическое уравнение этой реакции.


**Решение.** Уравнения реакций, в которых около символов химических соединений указываются их агрегатные состояния или кристаллическая модификация, а также численное значение тепловых эффектов, называются термохимическими. В термохимических уравнениях, если это специально не оговорено, указываются значения тепловых эффектов при постоянном давлении  $Q_p$ , равные изменению энтальпии системы  $\Delta H$ . Значение  $\Delta H$

приводят обычно в правой части уравнения, отделяя его запятой или точкой с запятой. Приняты следующие сокращенные обозначения агрегатного состояния веществ: г–газообразное, ж–жидкое, к–кристаллическое. Эти символы опускаются, если агрегатное состояние веществ очевидно.

Если теплота в результате реакции выделяется, то  $\Delta H < 0$ . Учитывая сказанное, составляем термохимическое уравнение данной в примере реакции:



**Пример 2.** Реакция горения этана выражается термохимическим уравнением




Вычислить теплоту образования этана, если известны теплоты образования  $\text{CO}_2 (\text{г})$  и  $\text{H}_2\text{O} (\text{ж})$  (табл. 1).

Таблица 1




**Стандартные теплоты (энтальпии) образования некоторых веществ**

| Вещество               | Состояние | $\Delta H^0_{298}$<br>кДж/моль | Вещество                        | Состояние | $\Delta H^0_{298}$<br>кДж/моль |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| $\text{CS}_2$          | г         | +115,28                        | $\text{CH}_3\text{OH}$          | г         | -201,17                        |
| $\text{NO}$            | г         | +90,37                         | $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ | г         | -235,31                        |
| $\text{C}_6\text{H}_6$ | г         | +82,93                         | $\text{H}_2\text{O}$            | г         | -241,83                        |
| $\text{C}_2\text{H}_4$ | г         | +52,28                         | $\text{H}_2\text{O}$            | ж         | -285,84                        |
| $\text{H}_2\text{S}$   | г         | -20,15                         | $\text{NH}_4\text{Cl}$          | к         | -315,39                        |
| $\text{NH}_3$          | г         | -46,19                         | $\text{CO}_2$                   | г         | -393,51                        |
| $\text{CH}_4$          | г         | -74,85                         | $\text{Fe}_2\text{O}_3$         | к         | -822,10                        |
| $\text{C}_2\text{H}_6$ | г         | -84,67                         | $\text{Ca}(\text{OH})_2$        | к         | -986,50                        |
| $\text{HCl}$           | г         | -92,31                         | $\text{Al}_2\text{O}_3$         | к         | -1669,80                       |
| $\text{CO}$            | г         | -110,52                        |                                 |           |                                |


**Решение.** Теплотой образования (энтальпией) данного соединения называют тепловой эффект реакции образования одного моль этого соединения из простых веществ, взятых в их устойчивом состоянии при данных условиях. Обычно теплоты образования относят к стандартному состоянию, т. е. к  $25^\circ\text{C}$  (298 К), и 1 атм и обозначают через  $\Delta H^0_{298}$ . Так как тепловой эффект с температурой изменяется незначительно, то здесь и в дальнейшем индексы опускаются и тепловой эффект обозначается через  $\Delta H$ . Следовательно, нужно вычислить тепловой эффект реакции, термохимическое уравнение которой имеет вид



исходя из следующих данных:






На основании закона Гесса с термохимическими уравнениями можно оперировать так же, как и с алгебраическими. Для получения искомого результата следует уравнение (б) умножить на 2, уравнение (в) – на 3, а затем сумму этих уравнений вычесть из уравнения (а):



Так как теплота образования равна теплоте разложения с обратным знаком, то  $\Delta H^{\text{обр}}_{\text{C}_2\text{H}_6(\text{г})} = -84,67 \text{ кДж}$ . К тому же результату придем, если для решения задачи применить вывод из закона Гесса:



Учитывая, что теплоты образования простых веществ условно приняты равными нулю,






**Пример 3.** Реакция горения этилового спирта выражается термохимическим уравнением:




Вычислить тепловой эффект реакции, если известно, что молярная теплота парообразования  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} (\text{ж})$  равна +42,36 кДж и известны теплоты образования:  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} (\text{г}); \text{CO}_2 (\text{г}); \text{H}_2\text{O} (\text{ж})$  (табл. 1).

**Решение.** Для определения  $\Delta H$  реакции необходимо знать теплоту образования  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} (\text{ж})$ . Последнюю находим из данных задачи:



Вычисляем  $\Delta H$  реакции, применяя следствие из закона Гесса:



**Пример 4.** Растворение моля безводной соды  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  в достаточно большом количестве воды сопровождается выделением 25,10 кДж теплоты, тогда как при растворении кристаллогидрата  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  поглощается 66,94 кДж теплоты. Вычислить теплоту гидратации  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (теплоту образования кристаллогидрата).

**Решение.** Составляем термохимические уравнения соответствующих реакций:

а)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{aq} = \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{aq}$ ;  $\Delta H = -25,10 \text{ кДж}$ ;

б)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + \text{aq} = \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{aq}$ ;  $\Delta H = +66,94 \text{ кДж}$ .

Вычитая уравнение (б) из уравнения (а) (пример 2), получаем ответ:

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ;  $\Delta H = -92,04 \text{ кДж}$ ,

т. е. при образовании  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  выделяется 92,04 кДж теплоты.

**93.** Вычислите тепловой эффект реакции восстановления одного моля  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  металлическим алюминием. *Ответ:*  $-847,7 \text{ кДж}$ .

**94.** Газообразный этиловый спирт  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  можно получить при взаимодействии этилена  $\text{C}_2\text{H}_4$  (г) и водяных паров. Напишите термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой эффект. *Ответ:*  $-45,76 \text{ кДж}$ .

**95.** Вычислите тепловой эффект реакции восстановления оксида железа (+2) водородом исходя из следующих термохимических уравнений:

$\text{FeO} (\text{к}) + \text{CO} (\text{г}) = \text{Fe} (\text{к}) + \text{CO}_2 (\text{г})$ ;  $\Delta H = -13,18 \text{ кДж}$ ;

$\text{CO} (\text{г}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{г}) = \text{CO}_2 (\text{г})$ ;  $\Delta H = -283,0 \text{ кДж}$ ;

$\text{H}_2 (\text{г}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{г}) = \text{H}_2\text{O} (\text{г})$ ;  $\Delta H = -241,83 \text{ кДж}$ .

*Ответ:*  $+27,99 \text{ кДж}$ .

**96.** При взаимодействии газообразных сероводорода и диоксида углерода образуются пары воды и сероуглерод  $\text{CS}_2$  (г). Напишите термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой эффект. *Ответ:*  $+65,43 \text{ кДж}$ .

**97.** Напишите термохимическое уравнение реакции между  $\text{CO}$  (г) и водородом, в результате которой образуются  $\text{CH}_4$  (г) и  $\text{H}_2\text{O}$  (г). Сколько теплоты выделится при этой реакции? *Ответ:*  $206,16 \text{ кДж}$ .

**98.** При взаимодействии газообразных метана и сероводорода образуются сероуглерод  $\text{CS}_2$  (г) и водород. Напишите термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой эффект. *Ответ:*  $+230,43 \text{ кДж}$ .

**99.** Кристаллический хлорид аммония образуется при взаимодействии газообразных аммиака и хлорида водорода. Напишите термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой эффект. Сколько теплоты выделится, если в реакции было израсходовано 10 л аммиака в пересчете на нормальные условия? *Ответ:*  $78,97 \text{ кДж}$ ,

**100.** Вычислите теплоту образования метана исходя из следующих термохимических уравнений;

$\text{H}_2 (\text{г}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{г}) = \text{H}_2\text{O} (\text{ж})$ ;  $\Delta H = -285,84 \text{ кДж}$ ;


$\text{C} (\text{к}) + \text{O}_2 (\text{г}) = \text{CO}_2 (\text{г})$ ;  $\Delta H = -393,51 \text{ кДж}$ ;

$\text{CH}_4 (\text{г}) + 2\text{O}_2 (\text{г}) = 2\text{H}_2\text{O} (\text{ж}) + \text{CO}_2 (\text{г})$ ;  $\Delta H = -890,31 \text{ кДж}$ .

*Ответ:*  $-74,88 \text{ кДж}$ .

**101.** Вычислите теплоту образования гидроксида кальция исходя из следующих термохимических уравнений:

$\text{Ca} (\text{к}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{г}) = \text{CaO} (\text{к})$ ;  $\Delta H = -635,60 \text{ кДж}$ ;



*Ответ:* –986,50 кДж


**102.** Тепловой эффект реакции сгорания жидкого бензола с образованием паров воды и диоксида углерода равен –3135,58 кДж. Составьте термохимическое уравнение этой реакции и вычислите теплоту образования  $\text{C}_6\text{H}_6(\text{ж})$ . *Ответ:* +49,03 кДж.

**103.** При взаимодействии трех молей оксида азота  $\text{N}_2\text{O}$  с аммиаком образуются азот и пары воды. Тепловой эффект реакции равен –877,76 кДж. Напишите термохимическое уравнение этой реакции и вычислите теплоту образования  $\text{N}_2\text{O}(\text{г})$ . *Ответ:* +81,55 кДж.

**104.** При сгорании газообразного аммиака образуются пары воды и монооксид азота  $\text{NO}(\text{г})$ . Напишите термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой эффект в расчете на один моль  $\text{NH}_3(\text{г})$ .

*Ответ:* –226,18 кДж.

**105.** Реакция горения метилового спирта выражается термохимическим уравнением:



Вычислите тепловой эффект этой реакции, если известно, что молярная теплота парообразования  $\text{CH}_3\text{OH}(\text{ж})$  равна +37,4 кДж.

*Ответ:* –726,62 кДж.

**106.** Напишите термохимическое уравнение реакции горения одного моля этилового спирта, в результате которой образуются пары воды и диоксид углерода. Вычислите теплоту образования  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{ж})$ , если известно, что при сгорании 11,5 г его выделилось 308,71 кДж теплоты.

*Ответ:* –277,67 кДж.

**107.** Реакция горения бензола выражается термохимическим уравнением:  $\text{C}_6\text{H}_6(\text{ж}) + 7\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{г}) = 6\text{CO}_2(\text{г}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{г}); \Delta H = ?$

Вычислите тепловой эффект этой реакции, если известно, что молярная теплота парообразования бензола равна +33,9 кДж. *Ответ:* –3135,58 кДж.

**108.** Вычислите тепловой эффект и напишите термохимическое уравнение реакции горения одного моля этана  $\text{C}_2\text{H}_6(\text{г})$ , в результате которой образуются пары воды и диоксид углерода. Сколько теплоты выделится при сгорании 1 м<sup>3</sup> этана в пересчете на нормальные условия? *Ответ:* 63742,86 кДж.

**109.** Реакция горения аммиака выражается термохимическим уравнением:  $4\text{NH}_3(\text{г}) + 3\text{O}_2(\text{г}) = 2\text{N}_2(\text{г}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{ж}); \Delta H = -1530,28 \text{ кДж}.$

Вычислите теплоту образования  $\text{NH}_3(\text{г})$ . *Ответ:* –46,19 кДж.

**110.** Теплота растворения безводного хлорида стронция  $\text{SrCl}_2$  равна –7,70 кДж, а теплота растворения кристаллогидрата  $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  равна +30,96 кДж. Вычислите теплоту гидратации  $\text{SrCl}_2$ . *Ответ:* –78,66 кДж.


**111.** Теплоты растворения сульфата меди  $\text{CuSO}_4$  и медного купороса  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  соответственно равны –66,11 кДж и +11,72 кДж. Вычислите

теплоту гидратации  $\text{CuSO}_4$ . *Ответ:*  $-77,83$  кДж.



**112.** При получении одного моля гидроксида кальция из  $\text{CaO}$  (к) и  $\text{H}_2\text{O}$  (ж) выделяется  $32,53$  кДж теплоты. Напишите термохимическое уравнение этой реакции и вычислите теплоту образования оксида кальция. *Ответ:*  $-635,6$  кДж.

**113.** Прямая или обратная реакция будет являться экзотермической при стандартных условиях в системе:  $\text{CH}_{4(\text{г})} + \text{CO}_{2(\text{г})} \leftrightarrow 2\text{CO}_{(\text{г})} + 2\text{H}_{2(\text{г})}$ . Подчитайте  $\Delta H^0$  и дайте на основании этого подсчета ответ.



**114.** Вычислите стандартные значения энтальпий реакций (предварительно подобрав коэффициенты):



**115.** Вычислите стандартные значения энтальпий реакций (предварительно подобрав коэффициенты):



**116.** Вычислите стандартные значения энтальпий реакций (предварительно подобрав коэффициенты):



## ХИМИЧЕСКОЕ СРОДСТВО

(При решении задач этого раздела см. табл. 2,3)

Самопроизвольно могут протекать реакции, сопровождающиеся не только выделением, но и поглощением теплоты.

Реакция, идущая при данной температуре с выделением теплоты, при другой температуре идет в обратном направлении, т.е. с поглощением теплоты. Здесь проявляется диалектический закон единства и борьбы противоположностей. С одной стороны, система стремится к упорядочению (агрегации), уменьшению  $H$ , с другой стороны, система стремится к беспорядку (деагрегации). Первая тенденция растет с понижением температуры, а вторая растет с повышением температуры. Тенденцию к беспорядку характеризует величина, которую называют **энтропией**.

Энтропия ( $S$ ), так же как внутренняя энергия ( $U$ ), энтальпия ( $H$ ), объем ( $V$ ) и др., является свойством вещества, пропорциональным его количеству.  $S$ ,  $U$ ,  $H$ ,  $V$  обладают аддитивными свойствами, т. е. при соприкосновении систем суммируются. Энтропия отражает движение частиц вещества и является мерой неупорядоченности системы. Она возрастает с увеличением движения частиц: при нагревании, испарении, плавлении, расширении газа, при ослаблении или разрыве связей между атомами и т. п. Процессы,

связанные с упорядоченностью системы: конденсация, кристаллизация, сжатие, упрочнение связей, полимеризация и т. п. – ведут к уменьшению энтропии. Энтропия является функцией состояния, т. е. ее изменение ( $\Delta S$ ) зависит только от начального ( $S_1$ ) и конечного ( $S_2$ ) состояния и не зависит от пути процесса

Если  $S_2 > S_1$  то  $\Delta S > 0$ .

Если  $S_2 < S_1$ , то  $\Delta S < 0$ .

Так как энтропия растет с повышением температуры, то можно считать, что мера беспорядка  $\approx T\Delta S$ . Энтропия выражается в Дж/моль·град. Таким образом, движущая сила процесса складывается из двух сил: стремление к упорядочению ( $H$ ) и стремление к беспорядку ( $TS$ ). При  $p = \text{const}$  и  $T = \text{const}$  общую движущую силу процесса, которую обозначают  $\Delta G$ , можно найти из соотношения

$$\Delta G = (H_2 - H_1) - (TS_2 - TS_1) = \Delta H - T\Delta S;$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S.$$

Величина  $G$  называется изобарно-изотермическим потенциалом или энергией Гиббса. Итак, мерой химического сродства является убыль  $G$  потенциала или  $\Delta G$ , которая зависит от природы вещества, его количества и от температуры. Энергия Гиббса является функцией состояния, поэтому самопроизвольно протекающие процессы идут в сторону уменьшения любого потенциала и, в частности, в сторону уменьшения  $\Delta G$ . Если  $\Delta G < 0$ , процесс принципиально осуществим, если  $\Delta G > 0$  – процесс самопроизвольно проходить не может. Чем меньше  $\Delta G$ , тем сильнее стремление к протеканию данного процесса и тем дальше он от состояния равновесия, при котором  $\Delta G = 0$  и  $\Delta H = T\Delta S$

Из соотношения  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$  видно, что самопроизвольно могут протекать и процессы, для которых  $\Delta H > 0$  (эндотермические). Это возможно, когда  $\Delta S > 0$ , но  $|T\Delta S| > |\Delta H|$ , и тогда  $\Delta G < 0$ . С другой стороны, экзотермические реакции ( $\Delta H < 0$ ) самопроизвольно не протекают, если при  $\Delta S < 0$  окажется, что  $\Delta G > 0$ .

Таблица 2

**Стандартные изобарные потенциалы образования  $G^0_{298}$  некоторых веществ**


| Вещество | Состояние | $\Delta G^0_{298}$ ,<br>кДж/моль | Вещество | Состояние | $\Delta G^0_{298}$ ,<br>кДж/моль |
|----------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
|          |           |                                  |          |           |                                  |

|                                |   |          |                               |   |         |
|--------------------------------|---|----------|-------------------------------|---|---------|
| BaCO                           | к | -1138,80 | FeO                           | к | -244,30 |
| CaCO <sub>3</sub>              | к | -1128,75 | H <sub>2</sub> O              | ж | -237,19 |
| Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | к | -1014,20 | H <sub>2</sub> O              | г | -228,59 |
| BeCO <sub>3</sub>              | к | -944,75  | CO                            | г | -137,27 |
| CaO                            | к | -604,20  | CH <sub>4</sub>               | г | -50,79  |
| BeO                            | к | -581,61  | NO <sub>2</sub>               | г | +51,84  |
| BaO                            | к | -528,40  | NO                            | г | +86,69  |
| CO <sub>2</sub>                | г | -394,38  | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> | г | +209,20 |

**Пример 1.** Что имеет большую энтропию: 1 моль кристаллического вещества или 1 моль его паров при той же температуре?

**Решение.** Энтропия есть мера неупорядоченного состояния вещества. В кристалле частицы (атомы, ионы) имеют упорядоченное расположение и могут находиться лишь в некоторых точках пространства, а для газа таких ограничений нет. 1 моль газа имеет гораздо больший объем, чем 1 моль кристалла, и возможность хаотичного движения молекул газа больше. А так как энтропию можно рассматривать как количественную меру хаотичности атомно-молекулярной структуры вещества, то энтропия моля паров вещества больше энтропии моля его кристаллов при одинаковой температуре.

**Пример 2.** Прямая или обратная реакция будет протекать при стандартных условиях в системе



**Решение.** Для ответа на вопрос следует вычислить  $\Delta G^0_{298}$  прямой реакции. Значения  $\Delta G^0_{298}$  соответствующих веществ даны в табл. 2. Зная, что  $\Delta G$  есть функция состояния и что  $\Delta G$  для простых веществ, находящихся в агрегатных состояниях, устойчивых при стандартных условиях, равны нулю, находим  $\Delta G^0_{298}$  процесса:

$$\Delta G^0_{298} = 2 \cdot (-137,27) + 2 \cdot (0) - (-50,79 - 394,38) = +170,63 \text{ кДж.}$$

То, что  $\Delta G^0_{298} > 0$ , указывает на невозможность самопроизвольного протекания прямой реакции при  $T=298 \text{ К}$  и равенстве давлений взятых газов 1 атм.


Таблица 3

### Стандартные абсолютные энтропии $S^0_{298}$ некоторых веществ

| Вещество | Состояние | $S^0_{298}$<br>Дж/моль.град | Вещество | Состояние | $S^0_{298}$<br>Дж/моль.град |
|----------|-----------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
|          |           |                             |          |           |                             |

|                                |        |        |                               |   |        |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------|---|--------|
| C                              | алмаз  | 2,44   | NH <sub>3</sub>               | г | 192,50 |
| C                              | графит | 5,69   | CO                            | г | 197,91 |
| S                              | ромб.  | 31,90  | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> | г | 200,82 |
| FeO                            | к      | 54,00  | O <sub>2</sub>                | г | 205,03 |
| H <sub>2</sub> O               | ж      | 69,94  | H <sub>2</sub> S              | г | 205,64 |
| NH <sub>4</sub> Cl             | к      | 94,50  | NO                            | г | 210,20 |
| CH <sub>3</sub> OH             | ж      | 126,8  | CO <sub>2</sub>               | г | 213,65 |
| H <sub>2</sub>                 | г      | 130,59 | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | г | 219,45 |
| Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | к      | 146,40 | Cl <sub>2</sub>               | г | 222,95 |
| CH <sub>4</sub>                | г      | 186,19 | NO <sub>2</sub>               | г | 240,46 |
| HCl                            | г      | 186,68 | PCl <sub>3</sub>              | г | 311,66 |
| H <sub>2</sub> O               | г      | 188,72 | PCl <sub>5</sub>              | г | 352,71 |
| N <sub>2</sub>                 | г      | 191,49 |                               |   |        |

**Пример 3.** На основании стандартных теплот образования (табл. 1) и абсолютных стандартных энтропии веществ (табл. 3) вычислите  $\Delta G^0_{298}$  реакции, протекающей по уравнению



**Решение.**  $\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$ ;  $\Delta H$  и  $\Delta S$  – функции состояния, поэтому

$$\Delta H^0_{\text{х.р.}} = \sum H^0_{\text{прод.}} - \sum H^0_{\text{исх.}}$$

$$\Delta S^0_{\text{х.р.}} = \sum S^0_{\text{прод.}} - \sum S^0_{\text{исх.}}$$

$$\sum H^0_{\text{х.р.}} = (-393,51 + 0) - (-110,52 - 285,84) = + 2,85 \text{ кДж};$$

$$\Delta S^0_{\text{х.р.}} = 213,65 + 130,59 - (197,91 + 69,94) = +76,39 \text{ Дж/ моль} \cdot \text{град} = + 0,07639 \text{ кДж/моль} \cdot \text{град};$$

$$\Delta G^0 = + 2,85 - 298(0,07639) = - 19,91 \text{ кДж.}$$

**Пример 4.** Восстановление Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> водородом протекает по уравнению: Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (к) + 3H<sub>2</sub> (г) = 2Fe (к) + 3H<sub>2</sub>O (г);  $\Delta H = + 96,61 \text{ кДж}$ .

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях, если изменение энтропии  $\Delta S = 0,1387 \text{ кДж/моль} \cdot \text{град}$ ? При какой температуре начнется восстановление Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>?

**Решение.** Вычисляем  $\Delta G^0$  реакции:

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 96,61 - 298 \cdot 0,1387 = +55,28 \text{ кДж}$ . Так как  $\Delta G > 0$ , то реакция при стандартных условиях невозможна; наоборот, при этих условиях идет обратная реакция окисления железа (коррозия). Найдем температуру, при которой  $\Delta G = 0$ :

$$\Delta H = T\Delta S; \quad T = \Delta H / \Delta S = 96,61 / 0,1387 = 696,5 \text{ К.}$$

Следовательно, при температуре  $\approx 696,5 \text{ К}$  начнется реакция восстановления Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Иногда эту температуру называют температурой начала реакции.

**117.** Теплоты образования  $\Delta H^0_{298}$  оксида и диоксида азота соответственно равны +90,37 кДж и +33,85 кДж. Определите  $\Delta S^0_{298}$  и  $\Delta G^0_{298}$


для реакций получения NO и NO<sub>2</sub> из простых веществ. Можно ли получить эти оксиды при стандартных условиях? Какой из оксидов образуется при высокой температуре? Почему?

*Ответ:* +11,94 Дж/моль·град; –60,315 Дж/моль·град; +86,81 кДж; +51,82 кДж.

**118.** При какой температуре наступит равновесие системы  
 $4\text{HCl (г)} + \text{O}_2 \text{ (г)} \leftrightarrow 2\text{H}_2\text{O (г)} + 2\text{Cl}_2 \text{ (г)}$ ;  $\Delta H = -114,42 \text{ кДж}$ ?


Что в этой системе является более сильным окислителем: хлор или кислород и при каких температурах? *Ответ:* 891 К.

**119.** Восстановление Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> оксидом углерода идет по уравнению:



Вычислите  $\Delta G^\circ_{298}$  и сделайте вывод о возможности самопроизвольного протекания этой реакции при стандартных условиях. Чему равно  $\Delta S^\circ_{298}$  в этом процессе? *Ответ:* + 24,19 кДж; +31,34 Дж/моль·град.

**120.** Реакция горения ацетилена идет по уравнению:



Вычислите  $\Delta G^\circ_{298}$  и  $\Delta S^\circ_{298}$  и объясните уменьшение энтропии в результате этой реакции.

*Ответ:* –1235,15 кДж; –216,15 Дж/моль·град.

**121.** Уменьшается или увеличивается энтропия при переходах: а) воды в пар; б) графита в алмаз? Почему? Вычислите  $\Delta S^\circ_{298}$  для каждого превращения. Сделайте вывод о количественном изменении энтропии при фазовых и аллотропических превращениях.

*Ответ:* а) 118,78 Дж/моль·град; б) –3,25 Дж/моль·град.


**122.** Чем можно объяснить, что при стандартных условиях невозможна экзотермическая реакция, протекающая по уравнению:



Зная тепловой эффект реакции и абсолютные стандартные энтропии соответствующих веществ, определите  $\Delta G^\circ_{298}$  этой реакции.


*Ответ:* +19,91 кДж.

**123.** Прямая или обратная реакция будет протекать при стандартных условиях в системе




Ответ мотивируйте, вычислив  $\Delta G^\circ_{298}$  прямой реакции. *Ответ:* –69,70 кДж.

**124.** Исходя из значений стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропии соответствующих веществ, вычислите  $\Delta G^\circ_{298}$  реакции, протекающей по уравнению




Может ли эта реакция при стандартных условиях идти самопроизвольно? *Ответ:* –92,08 кДж.

**125.** При какой температуре наступит равновесие системы




*Ответ:*  $\approx 385,5 \text{ К}$

**126.** Эндотермическая реакция взаимодействия метана с диоксидом углерода протекает по уравнению



При какой температуре начнется эта реакция? *Ответ:*  $\approx 961,9 \text{ К}$


**127.** Определите  $\Delta G^\circ_{298}$  реакции, протекающей по уравнению



Вычисления сделайте на основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропии соответствующих веществ. Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?

*Ответ:*  $-957,77 \text{ кДж.}$

**128.** На основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропии соответствующих веществ вычислите  $\Delta G^\circ_{298}$  реакции, протекающей по уравнению:




Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?

*Ответ:*  $-130,89 \text{ кДж.}$

**129.** Вычислите изменение энтропии в результате реакции образования аммиака из азота и водорода. При расчете можно исходить из  $\Delta S^\circ_{298}$  соответствующих газов, так как  $\Delta S$  с изменением температуры изменяется незначительно. Чем можно объяснить отрицательные значения  $\Delta S$ ? *Ответ:*  $-198,26 \text{ кДж/моль}\cdot\text{град.}$

**130.** Какие из карбонатов:  $\text{BeCO}_3$ ,  $\text{CaCO}_3$  или  $\text{BaCO}_3$  – можно получить по реакции взаимодействия соответствующих оксидов с  $\text{CO}_2$ ? Какая реакция идет наиболее энергично? Вывод сделайте, вычислив  $\Delta G^\circ_{298}$  реакций. *Ответ:*  $+31,24 \text{ кДж; } -130,17 \text{ кДж; } -216,02 \text{ кДж.}$

**131.** На основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите  $\Delta G^\circ_{298}$  реакции, протекающей по уравнению:




Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?

*Ответ:*  $-142,16 \text{ кДж.}$

**132.** Образование сероводорода из простых веществ протекает по уравнению:  $\text{H}_2 (\text{г}) + \text{S}_{\text{ромб}} = \text{H}_2\text{S} (\text{г}); \Delta H = -20,15 \text{ кДж.}$

Исходя из значений  $S^\circ_{298}$  соответствующих веществ, определите  $\Delta S^\circ_{298}$  и  $\Delta G^\circ_{298}$  для этой реакции. *Ответ:*  $+43,15 \text{ Дж/моль}\cdot\text{град; } -33,01 \text{ кДж.}$


**133.** На основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропии соответствующих веществ вычислите  $\Delta G^\circ_{298}$  реакции, протекающей по уравнению:



Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?


*Ответ;*  $-1331,21 \text{ кДж,}$

**134.** Определите, при какой температуре начнется реакция восстановления  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  протекающая по уравнению






Ответ: 1102,4 К.

**135.** Вычислите, при какой температуре начнется диссоциация пентахлорида фосфора, протекающая по уравнению



Ответ: 509 К.

**136.** Вычислите изменение энтропии для реакций, протекающих по уравнениям:




Почему в этих реакциях  $\Delta S^\circ_{298} > 0$ ;  $< 0$ ;  $\approx 0$ ?

Ответ: 220,21 Дж/моль·град; –198,26 Дж/моль·град; 2,93 Дж/моль·град.

## ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ

Кинетика – учение о скорости различных процессов, в том числе химических реакций. Критерием принципиальной осуществимости реакции является неравенство  $\Delta G_{p,T} < 0$ . Но это неравенство не является еще полной гарантией фактического течения процесса в данных условиях, не является достаточным для оценки кинетических возможностей реакции.

Так,  $(\Delta G^\circ_{298})_{\text{H}_2\text{O}(\Gamma)} = -228,59 \text{ кДж/моль}$ , а  $(\Delta G^\circ_{298})_{\text{AlI}_3(\kappa)} = -313,8 \text{ кДж/моль}$  и, следовательно, при  $T=298 \text{ К}$  и  $p=1 \text{ атм}$  возможны реакции, идущие по уравнениям:



Однако эти реакции при стандартных условиях идут только в присутствии катализатора (платины для первой и воды для второй). Катализатор как бы снимает кинетический «тормоз», и тогда проявляется термодинамическая природа вещества. Скорость химических реакций зависит от многих факторов, основные из которых – концентрация (давление) реагентов, температура и действие катализатора. Эти же факторы определяют и достижение равновесия в реагирующей системе.

**Пример 1.** Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной реакции в системе  $2\text{SO}_2 (\Gamma) + \text{O}_2 (\Gamma) \leftrightarrow 2\text{SO}_3 (\text{ж})$ , если объем газовой смеси уменьшить в три раза? В какую сторону сместится равновесие системы?

**Решение.** Обозначим концентрации реагирующих веществ:  $[\text{SO}_2]=a$ ,  $[\text{O}_2]=b$ ,  $[\text{SO}_3]=c$ . Согласно закону действия масс скорости ( $v$ ) прямой и обратной реакции до изменения объема

$$v_{\text{пр}} = K a^2 b;$$

$$v_{\text{обр}} = K_1 c^2$$

После уменьшения объема гомогенной системы в три раза концентрация каждого из реагирующих веществ увеличится в три раза:  $[SO_2]=3a$ ,  $[O_2]=3b$ ,  $[SO_3]=3c$ . При новых концентрациях скорости ( $v'$ ) прямой и обратной реакции:

$$v'_{пр} = K(3a)^2(3b) = 27 Ka^2b;$$

$$v'_{обр} = K_1(3c)^2 = 9 K_1c^2$$

Отсюда

$$v'_{пр}/v_{пр} = (27 Ka^2b)/(Ka^2b) = 27;$$

$$v'_{обр}/v_{обр} = (9 K_1c^2)/(K_1c^2) = 9$$

Следовательно, скорость прямой реакции увеличилась в 27 раз, а обратной – только в 9 раз. Равновесие системы сместилось в сторону образования серного ангидрида.

**Пример 2.** Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при повышении температуры от 30 до 70°C, если температурный коэффициент реакции равен 2.


**Решение.** Зависимость скорости химической реакции от температуры определяется эмпирическим правилом Вант-Гоффа по формуле

$$v_{t_2} = v_{t_1} \cdot \gamma^{(t_2-t_1)/10};$$

$$v_{t_2} = v_{t_1} \cdot 2^{(70-30)/10} = v_{t_1} \cdot 2^4 = 16v_{t_1}.$$

Следовательно, скорость реакции ( $v_{t_2}$ ), протекающей при температуре 70°C, увеличилась по сравнению со скоростью реакции ( $v_{t_1}$ ), протекающей при температуре 30°C, в 16 раз.

**Пример 3.** Константа равновесия гомогенной системы



при 850°C равна 1. Вычислите концентрации всех веществ при равновесии, если исходные концентрации:

$[CO]_{исх} = 3$  моль/л,  $[H_2O]_{исх} = 2$  моль/л.

**Решение.** При равновесии скорости прямой и обратной реакции равны, а отношение констант этих скоростей есть тоже величина постоянная и называется константой равновесия данной системы:

$$v_{пр} = K_1[CO][H_2O];$$

$$v_{обр} = K_2[CO_2][H_2];$$

$$K_{равн} = K_2/K_1 = [CO_2][H_2]/[CO][H_2O]$$

В условии задачи даны исходные концентрации, тогда как в выражение  $K_{равн}$  входят только равновесные концентрации всех веществ системы. Предположим, что к моменту равновесия концентрации  $[CO_2]_{равн} = x$  моль/л. Согласно уравнению системы число молей образовавшегося водорода при этом будет также  $x$  моль/л. По столько же молей ( $x$  моль/л)  $CO$  и  $H_2O$  расходуется для образования по  $x$  молей  $CO_2$  и  $H_2$ . Следовательно, равновесные концентрации всех четырех веществ будут:

$$[\text{CO}_2]_{\text{равн}} = [\text{H}_2]_{\text{равн}} = x \text{ моль/л};$$

$$[\text{CO}]_{\text{равн}} = (3 - x) \text{ моль/л};$$

$$[\text{H}_2\text{O}]_{\text{равн}} = (2 - x) \text{ моль/л}.$$

Зная константу равновесия, находим значение  $x$ , а затем и исходные концентрации всех веществ:

$$1 = x^2 / (3 - x)(2 - x)$$

$$x^2 = 6 - 2x - 3x + x^2; 5x = 6, \quad x = 1,2 \text{ моль/л}.$$

Таким образом, искомые равновесные концентрации:


$$[\text{CO}_2]_{\text{равн}} = 1,2 \text{ моль/л};$$

$$[\text{H}_2]_{\text{равн}} = 1,2 \text{ моль/л};$$

$$[\text{CO}]_{\text{равн}} = 3 - 1,2 = 1,8 \text{ моль/л};$$

$$[\text{H}_2\text{O}]_{\text{равн}} = 2 - 1,2 = 0,8 \text{ моль/л}.$$

**Пример 4.** Эндотермическая реакция разложения пентахлорида фосфора протекает по уравнению:



Как надо изменить: а) температуру; б) давление; в) концентрацию, чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции – разложения  $\text{PCl}_5$ ?

**Решение.** Смещением или сдвигом химического равновесия называют изменение равновесных концентраций реагирующих веществ в результате изменения одного из условий реакции. Направление, в котором сместилось равновесие, определяется по принципу Ле Шателье: а) так как реакция разложения  $\text{PCl}_5$  эндотермическая ( $\Delta H > 0$ ), то для смещения равновесия в сторону прямой реакции нужно повысить температуру; б) так как в данной системе разложение  $\text{PCl}_5$  ведет к увеличению объема (из одной молекулы газа образуются две газообразные молекулы), то для смещения равновесия в сторону прямой реакции надо уменьшить давление; в) смещения равновесия в указанном направлении можно достигнуть как увеличением концентрации  $\text{PCl}_5$ , так и уменьшением концентрации  $\text{PCl}_3$  или  $\text{Cl}_2$ .

**137.** Окисление серы и ее диоксида протекает по уравнениям: а)  $\text{S}(\text{к}) + \text{O}_2(\text{г}) = \text{SO}_2(\text{г})$ ; б)  $2\text{SO}_2(\text{г}) + \text{O}_2(\text{г}) = 2\text{SO}_3(\text{ж})$ . Как изменятся скорости этих реакций, если объемы каждой из систем уменьшить в 4 раза?

**138.** Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \leftrightarrow 2\text{NH}_3$ . Как изменится скорость прямой реакции образования аммиака, если увеличить концентрацию водорода в 3 раза?

**139.** Реакция идет по уравнению  $\text{N}_2 + \text{O}_2 = 2\text{NO}$ . Концентрации исходных веществ до начала реакции были:  $[\text{N}_2] = 0,049$  моль/л;  $[\text{O}_2] = 0,01$  моль/л. Вычислите концентрацию этих веществ в момент, когда  $[\text{NO}]$  стала равной 0,005 моль/л. *Ответ:*  $[\text{N}_2] = 0,0465$  моль/л;  $[\text{O}_2] = 0,0075$  моль/л,

**140.** Реакция идет по уравнению  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ . Концентрации участвующих в ней веществ были:  $[\text{N}_2] = 0,80$  моль/л;  $[\text{H}_2] = 1,5$  моль/л;  $[\text{NH}_3]$

=0,10 моль/л. Вычислите концентрацию водорода и аммиака, когда  $[N_2]$  стала равной 0,50 моль/л. *Ответ:*  $[NH_3]=0,70$  моль/л;  $[H_2]=0,60$  моль/л.

**141.** Реакция идет по уравнению  $H_2 + I_2 = 2HI$ . Константа скорости этой реакции при  $508^\circ C$  равна 0,16. Исходные концентрации реагирующих веществ были:  $[H_2]=0,04$  моль/л;  $[I_2]=0,05$  моль/л. Вычислите начальную скорость реакции и скорость ее, когда  $[H_2]$  стала равной 0,03 моль/л. *Ответ:*  $3,2 \cdot 10^{-4}$ ;  $1,92 \cdot 10^{-4}$ .

**142.** Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, если понизить температуру от  $120$  до  $80^\circ C$ . Температурный коэффициент скорости реакции равен трем.

**143.** Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при повышении температуры на  $60$  град, если температурный коэффициент скорости данной реакции равен двум?

**144.** Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при понижении температуры на  $30$  град, если температурный коэффициент скорости данной реакции равен трем?

**145.** Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы  $2SO_2 + O_2 \leftrightarrow 2SO_3$ . Как изменится скорость прямой реакции образования серного ангидрида, если увеличить концентрацию  $SO_2$  в 3 раза?

**146.** Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы  $CH_4 + CO_2 \leftrightarrow 2CO + 2H_2$ . Как следует изменить температуру и давление, чтобы повысить выход водорода? Прямая реакция образования водорода эндотермическая.

**147.** Реакция идет по уравнению  $2NO + O_2 = 2NO_2$ . Концентрации исходных веществ были:  $[NO]=0,03$  моль/л;  $[O_2]=0,05$  моль/л. Как изменится скорость реакции, если увеличить концентрацию кислорода до 0,10 моль/л и концентрацию  $NO$  до 0,06 моль/л?

**148.** Напишите, выражение для константы равновесия гетерогенной системы:  $CO_2 + C \leftrightarrow 2CO$ . Как изменится скорость прямой реакции образования  $CO$ , если концентрацию  $CO_2$  уменьшить в четыре раза? Как следует изменить давление, чтобы повысить выход  $CO$ ?


**149.** Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы  $C + H_2O (г) \leftrightarrow CO + H_2$ . Как следует изменить концентрацию и давление, чтобы сместить равновесие в сторону обратной реакции образования водяных паров?

**150.** Равновесие гомогенной системы  $4HCl (г) + O_2 \leftrightarrow 2H_2O (г) + 2Cl_2 (г)$  установилось при следующих концентрациях реагирующих веществ:  $[H_2O]=0,14$  моль/л;  $[Cl_2]=0,14$  моль/л;  $[HCl]=0,20$  моль/л;  $[O_2]=0,32$  моль/л. Вычислите исходные концентрации хлористого водорода и кислорода. *Ответ:*  $[HCl]_{исх}=0,48$  моль/л;  $[O_2]_{исх}=0,39$  моль/л.

**151.** Вычислите константу равновесия для гомогенной системы:  $CO(г) + H_2O(г) \leftrightarrow CO_2(г) + H_2(г)$ , если равновесные концентрации реагирующих веществ:  $[CO]=0,004$  моль/л;  $[H_2O]=0,064$  моль/л;  $[CO_2]=0,016$  моль/л;


$[H_2]=0,016$  моль/л. *Ответ:*  $K=1$

**152.** Константа равновесия гомогенной системы



при некоторой температуре равна 1. Вычислите равновесные концентрации всех реагирующих веществ, если исходные концентрации:  $[CO]=0,10$  моль/л;  $[H_2O]=0,40$  моль/л. *Ответ:*  $[CO_2]=[H_2]=0,08$  моль/л;  $[CO]=0,02$  моль/л;  $[H_2O]=0,32$  моль/л.


**153.** Константа равновесия гомогенной системы



при температуре  $400^\circ C$  равна 0,1. Равновесные концентрации водорода и аммиака соответственно равны: 0,2 моль/л и 0,08 моль/л. Вычислите равновесную и исходную концентрацию азота.

*Ответ:* 8 моль/л; 8,04 моль/л.

**154.** При некоторой температуре равновесие гомогенной системы



установилось при следующих концентрациях реагирующих веществ:  $[NO]=0,2$  моль/л;  $[O_2]=0,1$  моль/л;  $[NO_2]=0,1$  моль/л. Вычислите константу равновесия и исходную концентрацию NO и  $O_2$ .

*Ответ:*  $K=2,5$ ;  $[NO]=0,3$  моль/л;  $[O_2]=0,15$  моль/л.

**155.** Почему при изменении давления смещается равновесие системы  $N_2 + 3H_2 \leftrightarrow 2NH_3$  и не смещается равновесие системы  $N_2 + O_2 \leftrightarrow 2NO$ ? Напишите выражения для констант равновесия каждой из данных систем.

**156.** Исходные концентрации NO и  $Cl_2$  в гомогенной системе:

$2NO + Cl_2 \leftrightarrow 2NOCl$  составляют соответственно: 0,5 и 0,2 моль/л. Вычислите константу равновесия, если к моменту наступления равновесия прореагировало 20% NO. *Ответ:* 0,416.

**157.** Для каких из указанных реакций уменьшение объема сосуда, в котором происходит реакция, приведет к смещению равновесия в том же направлении, что и понижение температуры? Ответ обосновать.

1.  $N_{2(g)} + O_{2(g)} \leftrightarrow 2NO_{(g)} - Q$ ;
2.  $CO_{2(g)} + C_{(тв)} \leftrightarrow 2CO_{(g)} - Q$ ;
3.  $CO_{(г)} + H_2O_{(г)} \leftrightarrow CO_{2(г)} + H_{2(г)} + Q$ ;
4.  $2SO_{2(г)} + O_{2(г)} \leftrightarrow 2SO_{3(г)} + Q$ ;
5.  $2CO_{(г)} + O_{2(г)} \leftrightarrow 2CO_{2(г)} + Q$ .

**158.** Какие из указанных способов могут быть использованы для смещения вправо равновесия химической реакции:  $N_{2(г)} + O_{2(г)} \leftrightarrow 2NO_{(г)} - Q$

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Уменьшение конц. $O_2$ ; | 6. Применение катализатора; |
| 2. Увеличение конц. $N_2$ ; | 7. Повышение давления;      |
| 3. Увеличение конц. $O_2$ ; | 8. Понижение температуры;   |
| 4. Уменьшение конц. $N_2$ ; | 9. Повышение температуры;   |
| 5. Уменьшение конц. NO.     | Ответ обосновать.           |

**159.** Экзотермическая реакция разложения пентахлорида фосфора протекает по уравнению:  $PCl_{5(г)} \leftrightarrow PCl_{3(г)} + Cl_{2(г)}$ ,  $\Delta H = +92,59 \text{ кДж}$ .



Как надо изменить: а) давление, б) концентрацию реагирующих веществ, чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции разложения  $\text{PCl}_5$ ?

Ответ обосновать.

**160.** Применяя принцип Ле Шателье, укажите, в каком направлении произойдет смещение равновесия системы:



$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$ ,  $\Delta H = +2,85 \text{ кДж}$ , если: а) увеличить концентрацию водорода, б) понизить температуру, в) понизить концентрацию  $\text{CO}_2$ . Ответ обосновать.

**161.** Какое состояние системы называют химическим равновесием? В каком направлении произойдет смещение равновесия при уменьшении давления систем:



Напишите выражения для констант равновесия данных реакций.

**162.** Напишите выражения для констант равновесия реакции:



Как отразится повышение давления на равновесие этих реакций?

## СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА

Концентрацией раствора называется количество растворенного вещества, содержащееся в определенном массовом или объемном количестве раствора или растворителя.

**Пример 1.** Вычислите: а) массовую долю ( $\omega\%$ ); б) молярную ( $C_x$ ); в) нормальную ( $C_{\text{эк}}$ ); г) моляльную ( $C_m$ ) концентрации раствора  $\text{H}_3\text{PO}_4$ , полученного при растворении 18 г кислоты в  $282 \text{ см}^3$  воды, если плотность его  $1,031 \text{ г/см}^3$ . Чему равен титр ( $T$ ) этого раствора?

**Решение:** а) **Массовая доля** есть отношение массы растворенного вещества, содержащегося в растворе, к общей массе этого раствора. Обычно эту концентрацию считают на  $100 \text{ г}$  раствора. Так как массу  $282 \text{ см}^3$  воды можно принять равной  $282 \text{ г}$ , то масса полученного раствора:  $18 + 282 = 300 \text{ г}$  и, следовательно:

$$300 - 18$$

$$100 - \omega (\%)$$

$$\omega (\%) = 100 \cdot 18 / 300 = 6\%$$

б) **Молярная концентрация** (молярность) есть отношение количества

растворенного вещества в молях, содержащегося в растворе, к объему (1 л) раствора. Единицы – моль/м<sup>3</sup>; моль/дм<sup>3</sup>; моль/см<sup>3</sup>. Масса 1 л раствора 1031 г. Массу кислоты в литре раствора находим из соотношения

$$300 - 18$$

$$1031 - x$$

$$x = 1031 \cdot 18 / 300 = 61,86$$

Молярность раствора получим делением числа граммов Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> в 1 л раствора на молекулярную массу Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub>:

$$C_x = 61,86 / 97,99 = 0,63 \text{ моль/дм}^3(\text{М});$$

в) **Молярная концентрация эквивалента**, или нормальность, есть отношение количества растворенного вещества эквивалента в растворе к объему раствора. Единица – моль/дм<sup>3</sup>.

$$\text{Так как } M_{\text{эк}}(\text{H}_3\text{PO}_4) = M/3 = 97,99/3 = 32,66 \text{ г},$$

$$\text{то } C_{\text{эк}} = 61,86 / 32,66 = 1,89 \text{ моль/дм}^3(\text{н.});$$

г) **Моляльная концентрация**, или моляльность, есть отношение количества растворенного вещества в молях к массе растворителя. Единица – моль/кг.

Массу Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> в 1000 г растворителя находим из соотношения:

$$282 - 18$$

$$1000 - x$$

$$x = (1000 \cdot 18) / 282 = 68,83$$

$$\text{Отсюда } C_m = 68,83 / 97,99 = 0,65 \text{ моль/кг.}$$

д) **Титром** раствора называется количество граммов растворенного вещества в 1 см<sup>3</sup> (мл) раствора. Так как в 1 л раствора содержится 61,86 г кислоты, то

$$T = 61,86 / 1000 = 0,06186 \text{ г/см}^3.$$

Зная нормальность раствора и эквивалент (Э) растворенного вещества, титр легко найти по формуле

$$T = C_{\text{эк}} \cdot \text{Э} / 1000.$$

**Пример 2.** На нейтрализацию 50 см<sup>3</sup> раствора кислоты израсходовано 25 см<sup>3</sup> 0,5 н. раствора щелочи. Чему равна нормальность кислоты?

**Решение.** Так как вещества взаимодействуют между собой в эквивалентных количествах, то растворы равной нормальности реагируют в равных объемах. При разных нормальностях объемы растворов реагирующих веществ обратно пропорциональны их нормальностям, т. е.:

$$V_1/V_2 = C_{\text{эк}2}/C_{\text{эк}1} \text{ или } V_1 \cdot C_{\text{эк}1} = V_2 C_{\text{эк}2},$$

$$50 C_{\text{эк}1} = 25 \cdot 0,5, \text{ откуда } C_{\text{эк}1} = 25 \cdot 0,5 / 50 = 0,25 \text{ н.}$$

**Пример 3.** К 1 л 10%-ного раствора КОН (плотность 1,092 г/см<sup>3</sup>) прибавили 0,5 л 5%-ного раствора КОН (плотность 1,045 г/см<sup>3</sup>). Объем смеси довели до 2 л. Вычислите молярную концентрацию полученного раствора.

**Решение.** Масса одного литра 10%-ного раствора КОН 1092 г. В этом растворе содержится

$$1092 \cdot 10/100 = 109,2 \text{ г КОН.}$$

Масса 0,5 л 5%-ного раствора  $1045 \cdot 0,5 = 522,5 \text{ г}$ . В этом растворе содержится

$$522,5 \cdot 5/100 = 26,125 \text{ г КОН,}$$

В общем объеме полученного раствора (2 л) масса КОН составляет

$$109,2 + 26,125 = 135,325 \text{ г. Отсюда молярность этого раствора}$$

$$C_x = 135,325/2 \cdot 56,1 = 1,2 \text{ М,}$$

где 56,1 г/моль – молекулярная масса КОН.

**Пример 4.** Какой объем 96%-ной кислоты, плотность которой 1,84 г/см<sup>3</sup>, потребуется для приготовления 3 л 0,4 н. раствора?

**Решение.** Эквивалентная масса  $H_2SO_4 = M/2 = 98,08/2 = 49,04 \text{ г/моль}$ . Для приготовления 3 л 0,4 н. раствора требуется  $49,04 \cdot 0,4 \cdot 3 = 58,848 \text{ г } H_2SO_4$ . Масса 1 см<sup>3</sup> 96%-ной кислоты 1,84 г. В этом растворе содержится

$$1,84 \cdot 96/100 = 1,766 \text{ г } H_2SO_4$$

Следовательно, для приготовления 3 л 0,4 н. раствора надо взять  $58,848 : 1,766 = 33,32 \text{ см}^3$  этой кислоты.

**163.** Вычислите молярную и нормальную концентрации 20%-ного раствора хлорида кальция, плотность которого 1,178 г/см<sup>3</sup>.

*Ответ:* 2,1 М; 4,2 н.

**164.** Чему равна нормальность 30%-ного раствора NaOH, плотность которого 1,328 г/см<sup>3</sup>? К 1 л этого раствора прибавили 5 л воды. Вычислите массовую долю полученного раствора.

*Ответ:* 9,96 н.; 6,3%.

**165.** К 3 литрам 10%-ного раствора  $HNO_3$ , плотность которого 1,054 г/см<sup>3</sup>, прибавили 5 л 2%-ного раствора той же кислоты с плотностью 1,009 г/см<sup>3</sup>. Вычислите массовую долю и молярную концентрации полученного раствора, если считать, что его объем равен 8 л. *Ответ:* 5,0%; 0,82 М.

**166.** Вычислите нормальную и молярную концентрации 20,8%-ного раствора  $HNO_3$ , плотность которого 1,12 г/см<sup>3</sup>. Сколько граммов кислоты содержится в 4 л этого раствора? *Ответ:* 3,70 н.; 4,17 моль/кг; 931,8 г.

**167.** Вычислите молярную, нормальную и молярную концентрации 16%-ного раствора хлорида алюминия, плотность которого 1,149 г/см<sup>3</sup>. *Ответ:* 1,38 М; 4,14 н.; 1,43 моль/кг.

**168.** Сколько и какого вещества останется в избытке, если к 75 см<sup>3</sup> 0,3 н. раствора  $H_2SO_4$  прибавить 125 см<sup>3</sup> 0,2 н раствора КОН?

*Ответ:* 0,14 г КОН.

**169.** Для осаждения в виде AgCl всего серебра, содержащегося в 100 см<sup>3</sup> раствора  $AgNO_3$ , потребовалось 50 см<sup>3</sup> 0,2 н. раствора HCl. Чему равна нормальность раствора  $AgNO_3$ ? Сколько граммов AgCl выпало в осадок?

*Ответ:* 0,1 н.; 1,433 г.

**170.** Какой объем 20,01%-ного раствора HCl (плотность 1,100 г/см<sup>3</sup>) требуется для приготовления 1 л 10,17%-ного раствора (плотность 1,050 г/см<sup>3</sup>)? *Ответ:* 485,38 см<sup>3</sup>.

**171.** Смешали 10 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора HNO<sub>3</sub> (плотность 1,056 г/см<sup>3</sup>) и 100 см<sup>3</sup> 30%-ного раствора HNO<sub>3</sub> (плотность 1,184 г/см<sup>3</sup>). Вычислите массовую долю полученного раствора.

*Ответ:* 28,38%.

**172.** Какой объем 50%-ного раствора KOH (плотность 1,538 г/см<sup>3</sup>) требуется для приготовления 3 л 6%-ного раствора (плотность 1,048 г/см<sup>3</sup>)?

*Ответ:* 245,5 см<sup>3</sup>.

**173.** Какой объем 10%-ного раствора карбоната натрия Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (плотность 1,105 г/см<sup>3</sup>) требуется для приготовления 5 л 2%-ного раствора (плотность 1,02 г/см<sup>3</sup>)? *Ответ:* 923,1 см<sup>3</sup>.

**174.** На нейтрализацию 31 см<sup>3</sup> 0,16 н. раствора щелочи требуется 217 см<sup>3</sup> раствора H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Чему равны нормальность и титр раствора H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>? *Ответ:* 0,023 н.; 1,127 · 10<sup>-3</sup> г/см<sup>3</sup>.

**175.** Какой объем 0,3 н. раствора кислоты требуется для нейтрализации раствора, содержащего 0,32 г NaOH в 40 см<sup>3</sup>?

*Ответ:* 26,6 см<sup>3</sup>.

**176.** На нейтрализацию 1 л раствора, содержащего 1,4 г KOH, требуется 50 см<sup>3</sup> раствора кислоты. Вычислите нормальность раствора кислоты. *Ответ:* 0,53 н.

**177.** Сколько граммов HNO<sub>3</sub> содержалось в растворе, если на нейтрализацию его потребовалось 35 см<sup>3</sup> 0,4 н. раствора NaOH? Чему равен титр раствора NaOH? *Ответ:* 0,882 г, 0,016 г/см<sup>3</sup>.

**178.** Сколько граммов NaNO<sub>3</sub> нужно растворить в 400 г воды, чтобы приготовить 20%-ный раствор? *Ответ:* 100 г.

**179.** Смешали 300 г 20%-ного раствора и 500 г 40%-ного раствора NaCl. Чему равна массовая доля полученного раствора?

*Ответ:* 32,5%,

**180.** Смешали 247 г 62%-ного и 145 г 18%-ного раствора серной кислоты. Какова массовая доля раствора после смешения? *Ответ:* 45,72%.

**181.** Из 700 г 60%-ной серной кислоты выпариванием удалили 200 г воды. Чему равна концентрация оставшегося раствора? *Ответ:* 84%.

**182.** Из 10 кг 20%-ного раствора при охлаждении выделилось 400 г соли. Чему равна массовая доля охлажденного раствора? *Ответ:* 16,7%.

**183.** К 25 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты с массовой долей 0,96 (ρ = 1,84 г/см<sup>3</sup>) прибавили 100 см<sup>3</sup> воды. Рассчитайте массовую долю нового раствора и молярную концентрацию, если его ρ = 1,23 г/см<sup>3</sup>.

**184.** Вычислите молярную концентрацию эквивалента и молярную концентрацию раствора ортофосфорной кислоты с массовой долей 0,40 и ρ = 1,25 г/см<sup>3</sup>.

**185.** Рассчитайте, сколько см<sup>3</sup> соляной кислоты с массовой долей 0,38 и  $\rho=1,19$  г/см<sup>3</sup> нужно взять для приготовления 5 дм<sup>3</sup> 0,1 М раствора?

**186.** Молярная концентрация раствора гидроксида кальция равна 2 моль/дм<sup>3</sup>. Определите молярную концентрацию эквивалента этого раствора. Выведите формулу для пересчета молярной концентрации растворенного вещества в его массовую долю при известной плотности раствора.

**187.** Сколько граммов BaSO<sub>4</sub> выпадает в осадок, если к 50 см<sup>3</sup> 0,2 М раствора H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> прибавить избыток BaCl<sub>2</sub>?

**188.** Вычислите массовую долю карбоната калия и молярную концентрацию раствора, содержащего 75 г карбоната калия в 300 г воды.

**189.** Раствор нитрата калия содержит 192,6 г соли в 1 дм<sup>3</sup> ( $\rho=1,14$  г/см<sup>3</sup>). Рассчитайте массовую долю, молярную концентрацию, моляльность и титр раствора.

**190.** Молярная концентрация эквивалента раствора серной кислоты составляет 2 моль/дм<sup>3</sup>. Определите молярную концентрацию раствора.

## СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

**Пример 1.** Вычислить температуры кристаллизации и кипения 2%-ного водного раствора глюкозы C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>.

**Решение.** По закону Рауля понижение температуры кристаллизации и повышение температуры кипения раствора ( $\Delta t$ ) по сравнению с температурами кристаллизации и кипения растворителя выражается уравнением

$$\Delta t = K(m \cdot 1000) / M \cdot m_1 \quad (1)$$

где K – криоскопическая или эбуллиоскопическая константы. Для воды они соответственно равны 1,86 и 0,52 град; m и M – соответственно масса растворенного вещества и его молекулярная масса; m<sub>1</sub> – масса растворителя.

Понижение температуры кристаллизации 2%-ного раствора

$$\Delta t = 1,86 \cdot 2 \cdot 1000 / 180 \cdot 98 = 0,21 \text{ град.}$$

Вода кристаллизуется при 0°, следовательно, температура кристаллизации раствора 0 – 0,21 = –0,21°C.

Из формулы (1) повышение температуры кипения 2%-ного раствора C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>

$$\Delta t = 0,52 \cdot 2 \cdot 1000 / 180 \cdot 98 = 0,06 \text{ град.}$$

Вода кипит при 100°C, следовательно, температура кипения этого раствора 100 + 0,06 = 100,06 °C.

**Пример 2.** Раствор, содержащий 1,22 г бензойной кислоты C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COOH в 100 г сероуглерода, кипит при 46,529°C. Температура кипения сероуглерода 46,3°C. Вычислить эбуллиоскопическую константу сероуглерода.

**Решение.** Повышение температуры кипения  $\Delta t = 46,529 - 46,3 = 0,229$  град. Молекулярная масса бензойной кислоты равна 122 г/моль. Из формулы (1) находим эбуллиоскопическую константу:

$$K = \Delta t \cdot M \cdot m_1 / m \cdot 1000 = 0,229 \cdot 122 \cdot 100 / 1,22 \cdot 1000 = 2,29 \text{ град}$$

**Призер 3.** Раствор, содержащий 11,04 г глицерина в 800 г воды, кристаллизуется при  $-0,279^\circ\text{C}$ . Вычислить молекулярную массу глицерина.

**Решение.** Температура кристаллизации чистой воды  $0^\circ\text{C}$ , следовательно, понижение температуры кристаллизации  $\Delta t = 0 - (-0,279) = 0,279$  град. Масса глицерина  $m$  (г), приходящаяся на 1000 г воды,  
 $m = 11,04 \cdot 1000 / 800 = 13,8$ .

Подставляя в уравнение

$$M = K \cdot m / \Delta t \quad (2)$$

данные, вычисляем молекулярную массу глицерина:

$$M = 1,86 \cdot 13,8 / 0,279 = 92 \text{ г/моль.}$$

**Пример 4.** Вычислить массовую долю мочевины  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  в водном растворе, зная, что температура кристаллизации этого раствора равна  $-0,465^\circ\text{C}$ .

**Решение.** Температура кристаллизации чистой воды  $0^\circ\text{C}$ , следовательно,  $\Delta t = 0 - (-0,465) = 0,465$  град. Зная, что молекулярная масса мочевины 60 г/моль, находим массу  $m$  (г) растворенного вещества, приходящуюся на 1000 г воды, из формулы [2]:

$$M = \Delta t \cdot M / K = 0,465 \cdot 60 / 1,86 = 15$$

Общая масса раствора, содержащего 15 г мочевины, составляет  $1000 + 15 = 1015$  г. Массовую долю мочевины в данном растворе находим из соотношения

в 1015 г раствора – 15 г вещества

в 100 г раствора –  $x$  г вещества

$$x = 1,48\%.$$

**191.** Раствор, содержащий 0,512 г неэлектролита в 100 г бензола, кристаллизуется при  $5,296^\circ\text{C}$ . Температура кристаллизации бензола  $5,5^\circ\text{C}$ . Криоскопическая константа 5,1 град. Вычислите молекулярную массу растворенного вещества.

**192.** Вычислите массовую долю водного раствора сахара  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ , зная температуру кристаллизации раствора  $(-0,93^\circ\text{C})$ . Криоскопическая константа воды 1,86 град. *Ответ:* 14,6%.

**193.** Вычислите температуру кристаллизации раствора мочевины  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ , содержащего 5 г мочевины в 150 г воды. Криоскопическая константа воды 1,86 град.

**194.** Раствор, содержащий 3,04 г камфоры  $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$  в 100 г бензола,

кипит при  $80,714^{\circ}\text{C}$ . Температура кипения бензола  $80,2^{\circ}\text{C}$ . Вычислите эбуллиоскопическую константу бензола.

**195.** Вычислите массовую долю водного раствора глицерина  $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ , зная, что этот раствор кипит при  $100,39^{\circ}\text{C}$ . Эбуллиоскопическая константа воды  $0,52$  град. Ответ:  $6,45\%$ .

**196.** Вычислите молекулярную массу неэлектролита, зная, что раствор, содержащий  $2,25$  г этого вещества в  $250$  г воды, кристаллизуется при  $-0,279^{\circ}\text{C}$ . Криоскопическая константа воды  $1,86$  град.

**197.** Вычислите температуру кипения  $5\%$ -ного раствора нафталина  $\text{C}_{10}\text{H}_8$  в бензоле. Температура кипения бензола  $80,2^{\circ}\text{C}$ . Эбуллиоскопическая константа его  $2,57$  град. Ответ:  $81,25^{\circ}\text{C}$ .

**198.** Раствор, содержащий  $25,65$  г некоторого неэлектролита в  $300$  г воды, кристаллизуется при  $-0,465^{\circ}\text{C}$ . Вычислите молекулярную массу растворенного вещества. Криоскопическая константа воды  $1,86$  град.

**199.** Вычислите криоскопическую константу уксусной кислоты, зная, что раствор, содержащий  $3,56$  г антрацена  $\text{C}_{14}\text{H}_{10}$  в  $100$  г уксусной кислоты, кристаллизуется при  $15,718^{\circ}\text{C}$ . Температура кристаллизации уксусной кислоты  $16,65^{\circ}\text{C}$ .

**200.** Равные массовые количества камфоры  $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$  и нафталина  $\text{C}_{10}\text{H}_8$  растворены в одинаковых количествах бензола. Какой из растворов кипит при более высокой температуре?

**201.** Температура кристаллизации раствора, содержащего  $66,3$  г некоторого неэлектролита в  $500$  г воды, равна  $-0,558^{\circ}\text{C}$ . Вычислите молекулярную массу растворенного вещества. Криоскопическая константа воды  $1,86$  град.

**202.** Сколько граммов анилина  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$  следует растворить в  $50$  г этилового эфира, чтобы температура кипения раствора была выше температуры кипения этилового эфира на  $0,53$  град? Эбуллиоскопическая константа этилового эфира  $2,12$  град. Ответ:  $1,16$  г.

**203.** Вычислите температуру кристаллизации  $2\%$ -ного раствора этилового спирта  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ , зная, что криоскопическая константа воды  $1,86$  град. Ответ:  $-0,82^{\circ}\text{C}$ .

**204.** Сколько граммов мочевины  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  следует растворить в  $75$  г воды, чтобы температура кристаллизации понизилась на  $0,465$  град? Криоскопическая константа воды  $1,86$  град. Ответ:  $1,12$  г.

**205.** Вычислите массовую долю водного раствора глюкозы  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ , зная, что этот раствор кипит при  $100,26^{\circ}$ . Эбуллиоскопическая константа воды  $0,52$  град. Ответ:  $8,25\%$ .

**206.** Сколько граммов фенола  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$  следует растворить в  $125$  г бензола, чтобы температура кристаллизации раствора была ниже температуры кристаллизации бензола на  $1,7$  град? Криоскопическая константа бензола  $5,1$  град. Ответ:  $3,91$  г.

**207.** Сколько граммов мочевины  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  следует растворить в  $250$  г

воды, чтобы температура кипения повысилась на 0,26 град? Эбуллиоскопическая константа воды 0,52 град. *Ответ:* 7,5 г.

**208.** При растворении 2,3 г некоторого неэлектролита в 125 г воды температура кристаллизации понижается на 0,372 град. Вычислите молекулярную массу растворенного вещества. Криоскопическая константа воды 1,86 град.

**209.** Вычислите температуру кипения 15%-ного водного раствора пропилового спирта  $C_3H_7OH$ , зная, что эбуллиоскопическая константа воды 0,52 град. *Ответ:* 101,52°C.

**210.** Вычислите массовую долю водного раствора метанола  $CH_3OH$ , температура кристаллизации которого  $-2,79^\circ C$ . Криоскопическая константа воды 1,86 град. *Ответ:* 4,58%.

## ИОННЫЕ РЕАКЦИИ ОБМЕНА

(При решении задач этого раздела см. табл. 5 приложения)

Реакции ионного обмена между электролитами в растворах удобно выражать в виде ионно-молекулярных (или просто ионных) уравнений, которые показывают сущность происходящих в растворах процессов. Эта форма записи отражает состояние веществ в растворе и их взаимодействие.

Направление реакции обмена между электролитами в растворе (смещение равновесия системы) определяется возможностью образования между ними малорастворимого, малодиссоциирующего или газообразного соединения, т.е. выводом каких-либо ионов из сферы реакции. При написании ионных уравнений следует придерживаться следующей формы записи:

1) формулы сильных электролитов пишутся в виде ионов, так как именно в таком состоянии они находятся в растворе.

2) формулы слабых электролитов, газов и малорастворимых веществ, следует писать в виде молекул.

К сильным электролитам относятся:

1) почти все соли (кроме  $CdCl_2$ ,  $HgCl_2$ ,  $Pb(CH_3COO)_2$ ,  $Fe(SCN)_3$  и некоторых других);

2) большинство минеральных кислот, например,  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$ ,  $HCl$ ,  $HBr$ ,  $HI$ ,  $HClO_4$ ;

3) гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов.

К слабым электролитам относятся:

1) почти все органические кислоты;

2) некоторые минеральные кислоты, например,  $H_2CO_3$ ,  $H_2S$ ,  $HCN$ ,  $H_2SiO_3$ ,  $HClO$ ,  $H_3AsO_4$ ;

3) многие гидроксиды металлов (кроме щелочных и щелочноземельных металлов), а также  $NH_4OH$ ; вода.



Сильные электролиты при растворении в воде практически полностью

диссоциируют на ионы, слабые электролиты - частично. В последнем случае процесс диссоциации является обратимым.

**211.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{NaHCO}_3$  и  $\text{NaOH}$ ;  $\text{K}_2\text{SiO}_3$  и  $\text{HCl}$ ;  $\text{BaCl}_2$  и  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .

**212.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{K}_2\text{S}$  и  $\text{HCl}$ ;  $\text{FeSO}_4$  и  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ ;  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  и  $\text{KOH}$ .

**213.** Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями:





**214.** К каждому из веществ:  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ;  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  прибавили раствор едкого калия. В каких случаях произошли реакции? Выразите их молекулярными и ионными уравнениями.

**215.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{KHCO}_3$  и  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ;  $\text{Zn}(\text{OH})_2$  и  $\text{NaOH}$ ;  $\text{CaCl}_2$  и  $\text{AgNO}_3$ .

**216.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{CuSO}_4$  и  $\text{H}_2\text{S}$ ;  $\text{BaCO}_3$  и  $\text{HNO}_3$ ;  $\text{FeCl}_3$  и  $\text{KOH}$ .

**217.** Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями:





**218.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{Sn}(\text{OH})_2$  и  $\text{HCl}$ ;  $\text{BeSO}_4$  и  $\text{KOH}$ ;  $\text{NH}_4\text{Cl}$  и  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .

**219.** К каждому из веществ:  $\text{KHCO}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{NiSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$  прибавили раствор серной кислоты. В каких случаях произошли реакции? Выразите их молекулярными и ионными уравнениями.

**220.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  и  $\text{NaI}$ ;  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  и  $\text{KI}$ ;  $\text{CdSO}_4$  и  $\text{Na}_2\text{S}$ .

**221.** Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями;





**222.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций

растворения гидроксида бериллия в растворе едкого натра; гидроксида меди(II) в растворе азотной кислоты.




**223.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  и  $\text{CaCl}_2$ ;  $\text{K}_2\text{CO}_3$  и  $\text{BaCl}_2$ ;  $\text{Zn}(\text{OH})_2$  и  $\text{KOH}$ .

**224.** Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями:



**225.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{CdS}$  и  $\text{HCl}$ ;  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  и  $\text{NaOH}$ ;  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  и  $\text{CoCl}_2$ .


**226.** Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями;



**227.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{H}_2\text{SO}_4$  и  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ;  $\text{FeCl}_3$  и  $\text{NH}_4\text{OH}$ ;  $\text{CH}_3\text{COONa}$  и  $\text{HCl}$ .

**228.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами  $\text{FeCl}_3$  и  $\text{KOH}$ ;  $\text{NiSO}_4$  и  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ ;  $\text{MgCO}_3$  и  $\text{HNO}_3$ .

**229.** Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями:



**230.** К каждому из веществ:  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NiSO}_4$ ,  $\text{Be}(\text{OH})_2$ ,  $\text{KHCO}_3$  прибавили раствор гидроксида натрия. В каких случаях произошли реакции? Выразите их молекулярными и ионными уравнениями.

**231.** К растворам каждого из веществ:  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CuCl}_2$ ,  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ,  $\text{HCl}$  прилили избыток гидроксида натрия. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**232.** Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций, протекающих при смешивании растворов:  $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{FeCl}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{KOH}$ ,  $\text{CaCO}_3 + \text{HCl}$ ,  $\text{CrCl}_3 +$  избыток  $\text{KOH}$ .

**233.** Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций, протекающих между веществами:  $\text{Na}_2\text{S} + \text{HCl}$ ,  $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{NaOH}$ . Указать, какие из них протекают необратимо и почему.

**234.** К растворам каждого из веществ:  $K_2S$ ,  $Pb(NO_3)_2$ ,  $CuCl_2$ ,  $NH_4OH$ ,  $NaNO_3$  прилили соляной кислоты. В каких случаях произошли реакции? Напишите молекулярные, а также ионно-молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**235.** Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций, протекающих при смешивании растворов:  $Ca(OH)_2 + FeCl_3$ ,  $CH_3COOH + KOH$ ,  $CaCO_3 + HCl$ ,  $CrCl_3 +$  избыток  $KOH$ .

## ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ

**236.** Составьте ионное и молекулярное уравнения совместного гидролиза, происходящего при смешивании растворов  $K_2S$  и  $CrCl_3$ . Каждая из взятых солей гидролизуются необратимо до конца.

**237.** Какое значение  $pH$  ( $>$ или $<$  7) имеют растворы солей  $MnCl_2$ ,  $Na_2CO_3$ ,  $Ni(NO_3)_2$ ? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

**238.** Какие из солей  $Al_2(SO_4)_3$ ,  $K_2S$ ,  $Pb(NO_3)_2$ ,  $KCl$  подвергаются гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

**239.** При смешивании растворов  $FeCl_3$  и  $Na_2CO_3$  каждая из взятых солей гидролизуются необратимо до конца. Выразите этот совместный гидролиз ионным и молекулярным уравнениями.

**240.** Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей  $CH_3COOK$ ,  $ZnSO_4$ ,  $Al(NO_3)_3$ . Какое значение  $pH$  ( $>$ или $<$  7) имеют растворы этих солей?

**241.** Какое значение  $pH$  (больше или меньше 7) имеют растворы солей  $Li_2S$ ,  $AlCl_3$ ,  $NiSO_4$ ? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

**242.** Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей  $Pb(NO_3)_2$ ,  $Na_2CO_3$ ,  $CoCl_2$ . Какое значение  $pH$  ( $>$ или $<$  7) имеют растворы этих солей?

**243.** Составьте ионное и молекулярное уравнения гидролиза соли, раствор которой имеет: а) щелочную реакцию; б) кислую реакцию.

**244.** Какое значение  $pH$  (больше или меньше 7) имеют растворы солей  $Na_3PO_4$ ,  $K_2S$ ,  $CuSO_4$ ? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

**245.** Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей  $CuCl_2$ ,  $Cs_2CO_3$ ,  $ZnCl_2$ . Какое значение  $pH$  (больше или меньше 7) имеют растворы этих солей?

**246.** Какие из солей  $RbCl$ ,  $Cr_2(SO_4)_3$ ,  $Ni(NO_3)_2$  подвергаются гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

**247.** При смешивании растворов  $\text{CuSO}_4$  и  $\text{K}_2\text{CO}_3$  выпадает осадок основной соли  $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$  и выделяется  $\text{CO}_2$ . Составьте ионное и молекулярное уравнения происходящего гидролиза.

**248.** Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей  $\text{Li}_2\text{S}$ ,  $\text{Cs}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NiCl}_2$ ,  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ . Какое значение pH (>или< 7) имеют растворы этих солей?

**249.** При смешивании растворов  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  и  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  каждая из взятых солей гидролизуются необратимо до конца. Составьте ионное и молекулярное уравнения происходящего совместного гидролиза.

**250.** Какие из солей  $\text{NaBr}$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ,  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{CoCl}_2$  подвергаются гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

**251.** Какие из солей  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{CrCl}_3$ ,  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{NaCN}$  подвергаются гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

**252.** Составьте ионное и молекулярное уравнения совместного гидролиза, происходящего при смешивании растворов  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$  и  $\text{Na}_2\text{S}$ . Каждая из взятых солей гидролизуются необратимо до конца.

**253.** Какое значение pH (>или< 7) имеют растворы следующих солей  $\text{K}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей.

**254.** Какие из солей  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{ZnCl}_2$  подвергаются гидролизу? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза соответствующих солей.

**255.** При смешивании растворов  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  и  $\text{Na}_2\text{S}$  каждая из взятых солей гидролизуются необратимо до конца. Выразите этот совместный гидролиз ионным и молекулярным уравнениями.

**256.** Какие из приведенных ниже солей гидролизуются? Для каждой из гидролизующихся солей написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза:  $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$ ,  $\text{KI}$ ,  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ .

**257.** Какое значение pH имеют растворы солей  $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ . Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза.

**258.** Какие из солей  $\text{NaClO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COOK}$ ,  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ,  $\text{K}_2\text{S}$  подвергаются гидролизу? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей.

**259.** Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей:  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ .

**260.** Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей  $\text{ZnBr}_2$ ,  $\text{CrI}_3$ ,  $\text{MgSO}_4$ . Укажите реакцию среды.

**261.** В какую сторону сместится равновесие гидролиза ацетата бария, если к раствору прибавить: а) щелочь, б) кислоту, в) хлорид аммония?

**262.** В какую сторону сместится равновесие гидролиза  $\text{NaCN}$ , если к раствору прибавить: а) щелочь, б) кислоту, в) бромид аммония?

263. В какую сторону сместится равновесие гидролиза  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , если к раствору прибавить: а) щелочь, б) кислоту, в) воду?

## КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2

### ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Окислительно-восстановительными называются реакции, сопровождающиеся изменением степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ. *Под степенью окисления (n) понимают тот условный заряд атома, который вычисляется, исходя из предположения, что молекула состоит только из ионов.* Окисление-восстановление – это единый взаимосвязанный процесс. *Окисление приводит к повышению степени окисления восстановителя, а восстановление к ее понижению у окислителя.*

Повышение или понижение степени окисления атомов отражается в электронных уравнениях исходя из того, что окислитель принимает электроны, а восстановитель их отдает. При этом не учитывается, переходят ли электроны от одного атома к другому полностью и образуются ионные связи, или электроны только оттягиваются к более электроотрицательному атому и возникает полярная связь. О возможности того или иного вещества проявлять окислительные, восстановительные или двойственные (как окислительные, так и восстановительные) свойства можно судить по степени окисления атомов, несущих эти функции.

*Атом того или иного элемента в своей высшей степени окисления не может ее повысить (отдать электроны) и проявляет только окислительные свойства, а в своей низшей степени окисления не может ее понизить (принять электроны) и проявляет только восстановительные свойства. Атом же элемента, имеющий промежуточную степень окисления, может проявлять как окислительные так и восстановительные свойства.* Например:

$\text{N}^{5+}(\text{HNO}_3)$   $\text{S}^{6+}(\text{H}_2\text{SO}_4)$  – проявляют только окислительные свойства;

проявляют окислительные и восстановительные свойства:

$\text{N}^{4+}(\text{NO}_2)$   $\text{S}^{4+}(\text{SO}_2)$

$\text{N}^{3+}(\text{HNO}_2)$

$\text{N}^{2+}(\text{NO})$   $\text{S}^{2+}(\text{SO})$


$\text{N}^{1+}(\text{N}_2\text{O})$

$\text{N}^0(\text{N}_2)$   $\text{S}^0(\text{S}_2; \text{S}_8)$

$\text{N}^{-1}(\text{NH}_2\text{OH})$   $\text{S}^{-1}(\text{H}_2\text{S}_2)$

$\text{N}^{-2}(\text{N}_2\text{H}_4)$

проявляют только восстановительные свойства:



При окислительно–восстановительных реакциях валентность атомов может и не меняться. Например, в окислительно-восстановительной реакции:  $\text{H}_2^0 + \text{Cl}_2^0 = 2\text{H}^+\text{Cl}^-$  валентность атомов водорода и хлора до и после реакции равна единице. Изменилась их степень окисления. Валентность определяет число связей, образованных данным атомом, и поэтому знака не имеет. Степень же окисления имеет тот или иной знак.

Степень окисления – понятие условное, т.к. большинство соединений не являются ионами, чаще встречаются соединения с ковалентной связью. Степень окисления – величина переменная. Вычисление степени окисления производится на основании того, что молекула любого вещества в целом электронейтральна, т.е. алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в молекуле равна нулю. Степень окисления атома обозначается арабскими цифрами со знаком (+) или (–) после цифры.

В простых веществах ( $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ) степень окисления элемента всегда равна нулю, так как в этих соединениях электронная плотность равномерно распределена между атомами в молекуле и не наблюдается одностороннего оттягивания электронных пар, участвующих в образовании химических связей. В простейших ковалентных соединениях значение положительной степени окисления элемента соответствует числу оттянутых от атома связывающих электронных пар, а величина отрицательной степени окисления – числом притянутых электронных пар.

В соединениях некоторые элементы проявляют всегда постоянную степень окисления, но для большинства элементов она в различных соединениях различна. В каждом конкретном случае степень окисления рассчитывается по формуле соединения.

Для определения степени окисления элементов в химических соединениях следует руководствоваться следующими положениями:

1. Постоянную степень окисления имеют щелочные металлы (+1), щелочноземельные металлы (+2), фтор (–1). Для водорода в большинстве соединений характерна степень окисления 1+, а в гидридах металлов и в некоторых других соединениях она равна 1–. Кислород в соединениях проявляет главным образом степень окисления 2–, к исключениям относятся пероксидные соединения, степень окисления кислорода в которых равна 1–, и фторид кислорода  $\text{OF}_2$ , в котором она равна 2+.

2. Так как молекула электронейтральна, то алгебраическая сумма степеней окисления атомов элементов с учетом состава молекулы равна нулю. Принимая во внимание это положение, легко определить степень окисления элементов в соединении. Для этого надо знать формулу соединения и степени окисления других элементов, входящих в состав этого соединения.

Например, необходимо вычислить степень окисления серы в серной кислоте:  $\text{H}_2\text{SO}_4$   $(1+)\cdot 2 + X + (-2)\cdot 4 = 0$   $X=6+$

Находим, что степень окисления серы равна 6+.

3. Степень окисления элементов в молекулах простых веществ  $O_2$ ,  $Cl_2$  и т.п. равна нулю.

4. Степень окисления металлов в атомарном состоянии согласно рентгенографическим исследованиям, установившим равномерное распределение электронной плотности в них, также равна нулю (Сг, Zn и т.п.).

5. Понятие о степени окисления является условным и не всегда характеризует настоящее состояние атомов в соединениях, но оно весьма удобно и полезно при классификации различных соединений, рассмотрении окислительно-восстановительных процессов, предсказания направления течения и продуктов химических реакций и т.д.

**Пример 1.** Исходя из степени окисления ( $n$ ) азота, серы и марганца в соединениях  $NH_3$ ,  $HNO_2$ ,  $HNO_3$ ,  $H_2S$ ,  $H_2SO_3$ ,  $H_2SO_4$ ,  $MnO_2$ ,  $KMnO_4$  определите, какие из них могут быть только восстановителями, только окислителями и какие проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства.

**Решение.** Степень окисления  $n(N)$  в указанных соединениях соответственно равна:  $-3$  (низшая),  $+3$  (промежуточная),  $+5$  (высшая);  $n(S)$  соответственно равна:  $-2$  (низшая),  $+4$  (промежуточная),  $+6$  (высшая);  $n(Mn)$  соответственно равна:  $+4$  (промежуточная),  $+7$  (высшая). Отсюда:  $N^{-3}H_3$ ,  $H_2S^{-2}$  – только восстановители;  $HN^{+5}O_3$ ,  $H_2S^{+6}O_4$ ,  $KMn^{+7}O_4$  – только окислители;  $HN^{+3}O_2$ ,  $H_2S^{+4}O_3$ ,  $Mn^{+4}O_2$  – окислители и восстановители.

**Пример 2.** Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами: а)  $H_2S$  и  $HI$ ; б)  $H_2S$  и  $H_2SO_3$ ; в)  $H_2SO_3$  и  $HClO_4$ ?


**Решение:** а) Определяем степень окисления:  $n(S)$  в  $H_2S = -2$ ;  $n(I)$  в  $HI = -1$ . Так как и сера и йод имеют свою низшую степень окисления, то оба взятых вещества проявляют только восстановительные свойства и взаимодействовать друг с другом не могут; б)  $n(S)$  в  $H_2S = -2$  (низшая);  $n(S)$  в  $H_2SO_3 = +4$  (промежуточная). Следовательно, взаимодействие этих веществ возможно, причем  $H_2SO_3$  будет окислителем; в)  $n(S)$  в  $H_2SO_3 = +4$  (промежуточная);  $n(Cl)$  в  $HClO_4 = +7$  (высшая). Взятые вещества могут взаимодействовать.  $H_2SO_3$  в этом случае будет проявлять уже восстановительные свойства.

**Пример 3.** Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции, идущей по схеме



**Решение.** Если в условии задачи даны как исходные вещества, так и продукты их взаимодействия, то написание уравнения реакции сводится, как

правило, к нахождению и расстановке коэффициентов. Коэффициенты определяют методом электронного баланса при помощи электронных уравнений. Вычисляем, как изменяют свою степень окисления восстановитель и окислитель, и отражаем это в электронных уравнениях:




Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу электронов, которое присоединяет окислитель. Общее наименьшее кратное для отданных и принятых электронов является число 10. Разделив это число на 5, получаем коэффициент 2 для окислителя и продукта его восстановления, а при делении 10 на 2 получаем коэффициент 5 для восстановителя и продукта его окисления. Коэффициенты перед веществами, атомы которых не меняют свою степень окисления, находят подбором. Уравнение реакции будет иметь вид



**Пример 4.** Составьте уравнение реакции взаимодействия цинка с концентрированной серной кислотой, учитывая максимальное восстановление последней.

**Решение.** Цинк как любой металл проявляет только восстановительные свойства. В концентрированной серной кислоте окислительную функцию несет сера (+6). Максимальное восстановление серы означает, что она приобретает минимальную степень окисления. Минимальная степень окисления серы как *p*-элемента VI А группы равна –2. Цинк как металл II В группы имеет постоянную степень окисления +2. Отражаем сказанное в электронных уравнениях:




Составляем уравнение реакции:




Перед  $H_2SO_4$  стоит коэффициент 5, а не 1, ибо четыре молекулы  $H_2SO_4$  идут на связывание четырех ионов  $Zn^{2+}$ , поэтому в таких уравнениях расстановку коэффициентов начинают с правой части.

**264.** Исходя из степени окисления хлора в соединениях  $HCl$ ,  $HClO_3$ ,  $HClO_4$  определите, какое из них является только окислителем, только восстановителем и какое может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции идущей по схеме




**265.** Реакции выражаются схемами:




Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.



**266.** Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или восстановление происходит при следующих превращениях:





На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме











**267.** Исходя из степени окисления фосфора в соединениях  $\text{PH}_3$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_3$  определите, какое из них является только окислителем, только восстановителем и какое может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме







**269.** Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или восстановление – происходит при следующих превращениях:  $\text{Mn}^{6+} \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ ;  $\text{Cl}^{5+} \rightarrow \text{Cl}^-$ ,  $\text{N}^{3-} \rightarrow \text{N}^{5+}$ . На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме



**271.** Исходя из степени окисления хрома, йода и серы в соединениях  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ,  $\text{KI}$  и  $\text{H}_2\text{SO}_3$  определите, какое из них является только окислителем, только восстановителем и какое может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме




**278.** Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами: а)  $\text{NH}_3$  и  $\text{KMnO}_4$ , б)  $\text{HNO}_2$  и  $\text{HI}$ ; в)  $\text{HCl}$  и  $\text{H}_2\text{Se}$ ? Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме:





**283.** Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами: а)  $\text{PH}_3$  и  $\text{HBr}$ ; б)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  и  $\text{H}_3\text{PO}_3$ ; в)  $\text{HNO}_3$  и  $\text{H}_2\text{S}$ ? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме  $\text{AsH}_3 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ .


**284.** Подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнениях реакций, укажите окислитель и восстановитель





**285.** Подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнениях реакций, укажите окислитель и восстановитель





**286.** Подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнениях реакций, укажите окислитель и восстановитель



**287.** Подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнениях реакций, укажите окислитель и восстановитель



**288.** Подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнениях реакций, укажите окислитель и восстановитель



\*См. условие задачи 265

## ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

(При решении задач этого раздела см. табл. 4)

Если металлическую пластинку опустить в воду, то расположенные на ее поверхности катионы металла будут гидратироваться полярными молекулами воды и переходить в жидкость. При этом электроны, в избытке остающиеся в металле, заряжают его поверхностный слой отрицательно. Возникает электростатическое притяжение между перешедшими в жидкость гидратированными катионами и поверхностью металла. В результате этого в системе устанавливается подвижное равновесие:



в растворе      на металле

где  $n$  – число электронов, принимающих участие в процессе. На границе металл – жидкость возникает двойной электрический слой, характеризующийся определенным скачком потенциала – электродным потенциалом. Абсолютные значения электродных потенциалов измерить не удастся. Электродные потенциалы зависят от ряда факторов (природы металла, концентрации, температуры и др.). Поэтому обычно определяют относительные электродные потенциалы в определенных условиях, называемых стандартными электродными потенциалами ( $E^\circ$ ).

Стандартным электродным потенциалом металла называют его электродный потенциал, возникающий при погружении металла в раствор собственного иона с концентрацией или активностью, равной 1 моль/л, измеренный по сравнению со стандартным водородным электродом, потенциал которого при  $25^\circ\text{C}$  условно принимается равным нулю ( $E^\circ=0$ ;  $\Delta G^\circ=0$ ).

Располагая металлы в ряд по мере возрастания их стандартных электродных потенциалов ( $E^\circ$ ), получаем так называемый «ряд напряжений».

Положение того или иного металла в ряду напряжений характеризует его восстановительную способность, а также окислительные свойства его ионов в водных растворах при стандартных условиях. Чем меньше значение  $E^\circ$ , тем большими восстановительными способностями обладает данный металл в виде простого вещества и тем меньше окислительные способности проявляют его ионы. И наоборот. Электродные потенциалы измеряют в приборах, которые получили название гальванических элементов.

Таблица 4

**Стандартные электродные потенциалы  $E^\circ$  некоторых металлов  
(ряд напряжений)**

| Электрод                | $E^\circ$ , В | Электрод                   | $E^\circ$ , В |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| $\text{Li}^+/\text{Li}$ | –3,045        | $\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}$ | –0,403        |
| $\text{Rb}^+/\text{Rb}$ | –2,925        | $\text{Co}^{2+}/\text{Co}$ | –0,277        |

|              |        |                 |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| $K^+/K$      | -2,924 | $Ni^{2+}/Ni$    | -0,250 |
| $Cs^+/Cs$    | -2,923 | $Sn^{2+}/Sn$    | -0,136 |
| $Ba^{2+}/Ba$ | -2,900 | $Pb^{2+}/Pb$    | -0,126 |
| $Ca^{2+}/Ca$ | -2,866 | $Fe^{3+}/Fe$    | -0,037 |
| $Na^+/Na$    | -2,714 | $2H^+/H_2$      | 0,000  |
| $Mg^{2+}/Mg$ | -2,370 | $Sb^{3+}/Sb$    | +0,200 |
| $Al^{3+}/Al$ | -1,662 | $Bi^{3+}/Bi$    | +0,215 |
| $Ti^{2+}/Ti$ | -1,603 | $Cu^{2+}/Cu$    | +0,337 |
| $Zr^{4+}/Zr$ | -1,580 | $Cu^+/Cu$       | +0,520 |
| $Mn^{2+}/Mn$ | -1,179 | $Hg_2^{2+}/2Hg$ | +0,788 |
| $V^{2+}/V$   | -1,180 | $Ag^+/Ag$       | +0,799 |
| $Cr^{2+}/Cr$ | -0,913 | $Hg^{2+}/Hg$    | +0,850 |
| $Zn^{2+}/Zn$ | -0,763 | $Pt^{2+}/Pt$    | +1,190 |
| $Cr^{3+}/Cr$ | -0,744 | $Au^{3+}/Au$    | +1,500 |
| $Fe^{2+}/Fe$ | -0,440 | $Au^+/Au$       | +1,700 |

Окислительно–восстановительная реакция, которая лежит в основе работы гальванического элемента, протекает в направлении, в котором э. д. с. элемента имеет положительное значение. В этом случае  $\Delta G^0 < 0$ , так как  $\Delta G^0 = -nFE^0$ .

**Пример 1.** Стандартный электродный потенциал никеля больше, чем у кобальта (табл. 4). Изменится ли это соотношение, если измерить потенциал никеля в растворе его ионов с концентрацией 0,001 моль/л, а кобальта – 0,1 моль/л?

**Решение.** Электродный потенциал металла (E) зависит от концентрации его ионов в растворе. Эта зависимость выражается уравнением Нернста:

$$E = E^0 + 0,058/n \cdot \lg C$$

где  $E^0$  – стандартный электродный потенциал; n – число электронов, принимающих участие в процессе; C – концентрация (при точных вычислениях – активность) гидратированных ионов металла в растворе, моль/л.  $E^0$  для никеля и кобальта соответственно равны -0,250 и -0,277В. Определим электродные потенциалы этих металлов при данных в условии концентрациях:

$$E_{Ni^{2+}/Ni} = 0,250 + 0,058/2 \lg 10^{-3} = -0,337 \text{ В},$$

$$E_{Co^{2+}/Co} = -0,227 + 0,058/2 \lg 10^{-1} = -0,306 \text{ В}$$

Таким образом, при изменившейся концентрации потенциал кобальта стал больше потенциала никеля.

**Пример 2.** Магниевую пластинку опустили в раствор его соли. При

этом электродный потенциал магния оказался равен  $-2,41$  В. Вычислите концентрацию ионов магния в моль/л.

**Решение.** Подобные задачи также решаются на основании уравнения Нернста (см. пример 1);

$$-2,41 = -2,370 + 0,058/2 \lg C,$$


$$-0,04 = 0,029 \lg C,$$

$$\lg C = -0,04 / 0,029 = -1,3793 = -2,6207,$$

$$C_{\text{Mg}^{2+}} = 4,17 \cdot 10^{-2} \text{ моль/л.}$$

**Пример 3.** Составьте схему гальванического элемента, в котором электродами являются магниевая и цинковая пластинки, опущенные в растворы их ионов с активной концентрацией 1 моль/л. Какой металл является анодом, какой катодом? Напишите уравнение окислительно-восстановительной реакции, протекающей в этом гальваническом элементе, и вычислите его э. д. с.

**Решение.** Схема данного гальванического элемента




Вертикальная черта обозначает поверхность раздела между металлом и раствором, а две черточки – границу раздела двух жидких фаз – пористую перегородку (или соединительную трубку, заполненную раствором электролита). Магний имеет меньший потенциал ( $-2,370$  В) и является анодом, на котором протекает окислительный процесс:



Цинк, потенциал которого  $-0,763$ В, – катод, т. е. электрод, на котором протекает восстановительный процесс:



Уравнение окислительно-восстановительной реакции, которая лежит в основе работы данного гальванического элемента, можно получить, сложив электронные уравнения анодного (1) и катодного (2) процессов:



Для определения электродвижущей силы – э. д. с. гальванического элемента из потенциала катода следует вычесть потенциал анода. Так как концентрация ионов в растворе равна 1 моль/л, то э. д. с. элемента равна разности стандартных потенциалов двух его электродов:

$$\text{э. д. с.} = E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} - E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -0,763 - (-2,37) = 1,607 \text{ В.}$$

**289.** В два сосуда с голубым раствором медного купороса поместили: в первый цинковую пластинку, а во второй серебряную. В каком сосуде цвет раствора постепенно пропадает? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующей реакции.

**290.** Увеличится, уменьшится или останется без изменения масса цинковой пластинки при взаимодействии ее с растворами: а)  $\text{CuSO}_4$ ; б)  $\text{MgSO}_4$ ; в)  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**291.** При какой концентрации ионов  $Zn^{2+}$  (в моль/л) потенциал цинкового электрода будет на 0,015 В меньше его стандартного электродного потенциала. *Ответ:* 0,30 моль/л.

**292.** Увеличится, уменьшится или останется без изменения масса кадмиевой пластинки при взаимодействии ее с растворами: а)  $AgNO_3$ ; б)  $ZnSO_4$ ; в)  $NiSO_4$ ? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**293.** Марганцевый электрод в растворе его соли имеет потенциал –1,23 В. Вычислите концентрацию ионов  $Mn^{2+}$  в моль/л. *Ответ:*  $1,89 \cdot 10^{-2}$  моль/л.

**294.** Потенциал серебряного электрода в растворе  $AgNO_3$  составил 95% от величины его стандартного электродного потенциала. Чему равна концентрация ионов  $Ag^+$  в моль/л? *Ответ:* 0,20 моль/л.

**295.** Никелевый и кобальтовый электроды опущены соответственно в растворы  $Ni(NO_3)_2$  и  $Co(NO_3)_2$ . В каком соотношении должна быть концентрация ионов этих металлов, чтобы потенциалы обоих электродов были одинаковыми? *Ответ:*  $C_{Ni^{2+}} : C_{Co^{2+}} \approx 0,117$ .

**296.** Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из которых медь была бы катодом, а в другом – анодом. Напишите для каждого из этих элементов электронные уравнения реакций, протекающих на катоде и на аноде.

**297.** При какой концентрации ионов  $Cu^{2+}$  в моль/л значение потенциала медного электрода становится равным стандартному потенциалу водородного элемента? *Ответ:*  $1,89 \cdot 10^{-12}$  моль/л.

**298.** Какой гальванический элемент называется концентрационным? Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, состоящего из серебряных электродов, опущенных первый в 0,01 н, а второй, – в 0,1 н растворы  $AgNO_3$ . *Ответ:* 0,058 В.

**299.** При каком условии будет работать гальванический элемент, электроды которого сделаны из одного и того же металла? Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, в котором один никелевый электрод находится в 0,001 М растворе, а другой такой же электрод – в 0,01 М растворе сульфата никеля. *Ответ:* 0,029 В.

**300.** Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, состоящего из свинцовой и магниевой пластин, опущенных в растворы своих солей с концентрацией  $[Pb^{2+}] = [Mg^{2+}] = 0,01$  моль/л. Изменится ли э. д. с. этого элемента, если концентрацию каждого из ионов увеличить в одинаковое число раз? *Ответ:* 2,244 В.

**301.** Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из которых никель является катодом, а в другом – анодом. Напишите для

каждого из этих элементов электронные уравнения реакций, протекающих на катоде и на аноде.


**302.** Железная и серебряная пластины соединены внешним проводником и погружены в раствор серной кислоты. Составьте схему данного гальванического элемента и напишите электронные уравнения процессов, происходящих на аноде и на катоде.

**303.** Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, состоящего из пластин кадмия и магния, опущенных в растворы своих солей с концентрацией  $[Mg^{2+}] = [Cd^{2+}] = 1$  моль/л. Изменится ли величина э. д. с, если концентрацию каждого из ионов понизить до 0,01 моль/л? *Ответ:* 1,967 В.

**304.** Составьте схему гальванического элемента, состоящего из пластин цинка и железа, погруженных в растворы их солей. Напишите электронные уравнения процессов, протекающих на аноде и на катоде. Какой концентрации надо было бы взять ионы железа (в моль/л), чтобы э. д. с. элемента стала равной нулю, если  $[Zn^{2+}] = 0,001$  моль/л?

*Ответ:*  $7,3 \cdot 10^{-15}$  моль/л.

**305.** Составьте схему гальванического элемента, в основе которого лежит реакция, протекающая по уравнению



Напишите электронные уравнения анодного и катодного процессов. Вычислите э. д. с. этого элемента, если  $[Ni^{2+}] = 0,01$  моль/л,  $[Pb^{2+}] = 0,0001$  моль/л. *Ответ:* 0,066 В.

**306.** Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке и разрядке свинцового аккумулятора?

**307.** Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке и разрядке кадмий-никелевого аккумулятора?

**308.** Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке и разрядке железо-никелевого аккумулятора?

**309.** В две пробирки с розовым раствором сульфата кобальта (II) опустили железную и медную проволоочки. В какой пробирке цвет раствора постепенно изменяется и почему?

**310.** В какой пробирке происходит реакция при внесении кадмиевых пластинок в растворы сульфата калия, концентрированной и разбавленной серной кислоты?

**311.** Какие из приведенных оксидов могут быть восстановлены алюминием:  $Mn_2O_3$ ,  $CuO$ ,  $Li_2O$ ,  $K_2O$ ? Напишите уравнения реакций.

**312.** Какие из приведенных оксидов могут быть восстановлены магнием:  $Fe_2O_3$ ,  $CaO$ ,  $Ag_2O$ ,  $Na_2O$ ? Напишите уравнения реакций.

**313.** Какие из приведенных оксидов могут быть восстановлены водородом:  $MgO$ ,  $CuO$ ,  $ZnO$ ,  $HgO$ ? Напишите уравнения реакций.

**314.** В каком случае происходит реакция при внесении цинковой, железной и свинцовой пластинок в пробирки с раствором сульфата олова (II)? Напишите молекулярные и электронные уравнения реакций.

**315.** Составьте гальванический элемент с ЭДС > 1,5 В. Напишите схему анодного и катодного процессов.

## ЭЛЕКТРОЛИЗ

**Пример 1.** Сколько граммов меди выделится на катоде при электролизе раствора  $\text{CuSO}_4$  в течение 1 ч при силе тока 4 А?

**Решение.** Согласно законам Фарадея

$$m = M_{\text{э}} i t / 96500, \quad (1)$$

где  $m$  – масса вещества, окисленного или восстановленного на электроде;  $M_{\text{э}}$  – эквивалентная масса вещества, г/моль;  $i$  – сила тока, А;  $t$  – продолжительность электролиза, с.

Эквивалентная масса меди в  $\text{CuSO}_4$  равна  $63,54:2=31,77$  г/моль. Подставив в формулу (1) значения  $M_{\text{э}}=31,77$ ,  $i=4$  А,  $t=60\cdot60=3600$  с, получим  $m=31,77\cdot4\cdot3600/96500=4,74$  г.

**Пример 2.** Вычислить молярную массу эквивалента металла, зная, что при электролизе раствора хлорида этого металла затрачено 3880 Кл электричества и на катоде выделяется 11,742 г металла.

**Решение.** Из формулы (1)

$$M_{\text{э}} = 11,742 \cdot 96500 / 3880 = 29,35 \text{ г/моль},$$

где  $m=11,742$  г;  $i\cdot t=Q=3880$  Кл.

**Пример 3.** Чему равна сила тока при электролизе раствора в течение 1 ч 40 мин 25 с, если на катоде выделилось 1,4 л водорода, измеренного при нормальных условиях?

**Решение.** Из формулы (1)

$$i = m \cdot 96500 / M_{\text{э}} t.$$

Так как количество водорода дано в объемных единицах, то отношение  $m/M_{\text{э}}$  заменяем отношением  $V_{\text{H}_2}/V_{\text{э}}(\text{H}_2)$ , где  $V_{\text{H}_2}$  – объем водорода в литрах;  $V_{\text{э}}(\text{H}_2)$  – эквивалентный объем водорода в л/моль. Тогда

$$i = V_{\text{H}_2} \cdot 96500 / V_{\text{э}}(\text{H}_2) t$$

Эквивалентный объем водорода при н. у. равен половине молекулярного объема  $22,4/2=11,2$  л/моль. Подставив в приведенную формулу значения  $V_{\text{H}_2}=1,4$  л,  $V_{\text{э}}(\text{H}_2)=11,2$  л/моль,  $t=6025$  с (1 ч 40 мин 25 с=6025 с), находим

$$i = 1,4 \cdot 96500 / 11,2 \cdot 6025 = 2 \text{ А}.$$

**Пример 4.** Сколько граммов едкого кали образовалось у катода при

электролизе раствора  $K_2SO_4$ , если на аноде выделилось 11,2 л кислорода, измеренного при нормальных условиях?

**Решение.** Эквивалентный объем кислорода (н. у.)  $22,4/4 = 5,6$  л/моль. Следовательно, 11,2 л составляют 2 эквивалентных объема кислорода. Столько же, т. е. 2 эквивалентных массы KOH образовалось у катода, или  $56,11 \cdot 2 = 112,22$  г (56,11 г/моль – молярная масса KOH).

**316.** Электролиз раствора  $K_2SO_4$  проводили при силе тока 5 А в течение 3 ч. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах, вычислите объем выделяющихся на электродах веществ.

**317.** Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе растворов  $AlCl_3$ ,  $NiSO_4$ . В обоих случаях анод угольный.

**318.** При электролизе раствора  $CuSO_4$  на аноде выделилось  $168 \text{ см}^3$  кислорода, измеренного при н. у. Сколько граммов меди выделилось на катоде?

**319.** Сколько граммов воды разложилось при электролизе раствора  $Na_2SO_4$  при силе тока 7 А в течение 5 ч?

**320.** Электролиз раствора нитрата серебра проводили при силе тока 2 А в течение 4 ч. Сколько граммов серебра выделилось на катоде?

**321.** Электролиз раствора сульфата некоторого металла проводили при силе тока 6 А в течение 46 мин, в результате чего на катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалентную массу металла.

**322.** Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе раствора KOH, расплава KOH.

**323.** Электролиз раствора сульфата цинка проводили в течение 5 ч, в результате чего выделилось 6 л кислорода, измеренного при н. у. Вычислите силу тока.

**324.** Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе раствора  $Al_2(SO_4)_3$  в случае угольного анода; в случае алюминиевого анода.

**325.** Какие вещества и в каком количестве выделяются на угольных электродах при электролизе раствора NaI в течение 2,5 ч, если сила тока равна 6 А?

**326.** При электролизе раствора  $AgNO_3$  масса серебряного анода уменьшилась на 5,4 г. Сколько кулонов электричества израсходовано на этот процесс?

**327.** Какие вещества и в каком количестве выделяются на угольных электродах при электролизе раствора KBr в течение 1 ч 35 мин при силе тока 15 А?

**328.** Составьте электронные уравнения процессов, происходящих при электролизе  $CuCl_2$ , если анод медный; если анод угольный?

**329.** На электролиз раствора  $CaCl_2$  израсходовано 10722,2 Кл

электричества. Вычислите массу выделяющихся на угольных электродах и образующегося возле катода веществ.

**330.** Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе раствора  $KCl$ ; расплава  $KCl$ .

**331.** Сколько времени проводят электролиз раствора электролита при силе тока 5 А, если на катоде выделяется 0,1 эквивалентных масс вещества? Сколько выделится вещества на аноде?

**332.** При электролизе растворов  $MgSO_4$  и  $ZnCl_2$ , соединенных последовательно с источником тока, на одном из катодов выделилось 0,25 г водорода. Сколько граммов вещества выделится на другом катоде; на анодах?

**333.** Чему равна сила тока, если при электролизе раствора  $MgCl_2$  в течение 30 мин на катоде выделилось 8,4 л водорода, измеренного при н. у. Вычислите массу вещества, выделяющегося на аноде.

**334.** Сколько граммов  $H_2SO_4$  образуется возле анода при электролизе раствора  $Na_2SO_4$ , если на аноде выделяется 1,12 л кислорода, измеренного при н. у.? Вычислите массу вещества, выделяющегося на катоде.

**335.** Вычислите силу тока, зная, что при электролизе раствора  $KOH$  в течение 1 ч 15 мин 20 с на аноде выделилось 6,4 г кислорода. Какое вещество и в каком количестве выделяется на катоде?

**336.** Составить схему электролиза водного раствора  $Fe_2(SO_4)_3$  с платиновым анодом.

**337.** Составить схему электролиза водного раствора  $AuCl_3$  с графитовым и медным анодом.

**338.** Составить схему электролиза водного раствора  $Na_2CO_3$  с угольным и цинковым анодом.

**339.** Составить схему электролиза раствора, содержащего смесь солей  $CuCl_2$ ,  $NiCl_2$ ,  $AuCl_3$ ,  $SbCl_3$  с инертными электродами.

**340.** Составить схему электролиза водного раствора  $FeCl_3$  с платиновым и железным анодами.

**341.** Составить уравнения процессов, протекающих при электролизе раствора  $Ca(NO_3)_2$  с инертным и медным анодами.

**342.** Составить уравнения процессов, протекающих при электролизе раствора  $NaF$  с платиновым анодом.

## КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ

(При решении задач этого раздела см. табл. 4)

**343.** Как происходит атмосферная коррозия луженого и оцинкованного железа при нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

**344.** Медь не вытесняет водород из разбавленных кислот. Почему? Однако если к медной пластинке, опущенной в кислоту, прикоснуться

цинковой, то на меди начинается бурное выделение водорода. Дайте этому объяснение, составив электронные уравнения анодного и катодного процессов. Напишите уравнение протекающей химической реакции.

**345.** Как происходит атмосферная коррозия луженого железа и луженой меди при нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

**346.** Если пластинку из чистого цинка опустить в разбавленную кислоту, то начинающееся выделение водорода вскоре почти прекращается. Однако при прикосновении к цинку медной палочкой на последней начинается бурное выделение водорода. Дайте этому объяснение, составив электронные уравнения анодного и катодного процессов. Напишите уравнение протекающей химической реакции.

**347.** В чем заключается сущность протекторной защиты металлов от коррозии? Приведите пример протекторной защиты никеля в электролите, содержащем растворенный кислород. Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

**348.** Если на стальной предмет нанести каплю воды, то коррозии подвергается средняя, а не внешняя часть смоченного металла. После высыхания капли в ее центре появляется пятно ржавчины. Чем это можно объяснить? Какой участок металла, находящийся под каплей воды, является анодным и какой катодным? Составьте электронные уравнения соответствующих процессов.

**349.** Если гвоздь вбить во влажное дерево, то ржавчиной покрывается та его часть, которая находится внутри дерева. Чем это можно объяснить? Анодом или катодом является эта часть гвоздя? Составьте электронные уравнения соответствующих процессов.

**350.** В раствор соляной кислоты поместили цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью. В каком случае процесс коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные уравнения соответствующих процессов.

**351.** Почему химически чистое железо является более стойким против коррозии, чем техническое железо? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при коррозии технического железа во влажном воздухе и в сильноокислой среде.

**352.** Какое покрытие металла называется анодным и какое катодным? Назовите несколько металлов, которые могут служить для анодного и катодного покрытия железа. Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при коррозии железа, покрытого медью во влажном воздухе и в сильноокислой среде.

**353.** Железное изделие покрыли кадмием. Какое это покрытие – анодное или катодное? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при нарушении покрытия во влажном воздухе и в соляной кислоте. Какие продукты коррозии

образуются в первом и во втором случаях?

**354.** Железное изделие покрыли свинцом. Какое это покрытие – анодное или катодное? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при нарушении покрытия во влажном воздухе и в соляной кислоте. Какие продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях?

**355.** Две железные пластинки, частично покрытые одна оловом, другая медью, находятся во влажном воздухе. На какой из этих пластинок быстрее образуется ржавчина? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этих пластинок. Каков состав продуктов коррозии железа?

**356.** В обычных условиях во влажном воздухе оцинкованное железо при нарушении покрытия не ржавеет, тогда как при температуре выше  $70^{\circ}\text{C}$  оно покрывается ржавчиной. Чем это можно объяснить? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии оцинкованного железа в первом и во втором случаях.

**357.** Если пластинку из чистого железа опустить в соляную кислоту, то выделение на ней водорода идет медленно и со временем почти прекращается. Однако если цинковой палочкой прикоснуться к железной пластинке, то на последней начинается бурное выделение водорода. Почему? Какой металл при этом растворяется? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

**358.** Цинковую и железную пластинки опустили в раствор сульфата меди. Составьте электронные и ионные уравнения реакций, происходящих на каждой из этих пластинок. Какие процессы будут проходить на пластинках, если наружные концы их соединить проводником?

**359.** Как влияет pH среды на скорость коррозии железа и цинка? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов атмосферной коррозии этих металлов.

**360.** В раствор электролита, содержащего растворенный кислород, опустили цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью. В каком случае процесс коррозии цинка происходит интенсивнее? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

**361.** Железные бочки применяют для транспортировки концентрированной серной кислоты, но после освобождения от кислоты бочки часто совершенно разрушаются вследствие коррозии. Чем это можно объяснить? Что является анодом и что катодом? Составьте электронные уравнения соответствующих процессов.

**362.** Как протекает атмосферная коррозия железа, покрытого слоем никеля, если покрытие нарушено? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. Каков состав продуктов коррозии?

**363.** Почему химически чистый цинк обнаруживает большую стойкость против коррозии, чем технический цинк? Напишите электронные уравнения

анодного и катодного процессов, протекающих при коррозии технического цинка в кислой среде.

**364.** Магниеваая пластинка, соединенная с оловянной пластинкой, опущена в соляную кислоту. Напишите электронные уравнения анодного и катодного процессов, протекающих при коррозии пластинки.

**365.** В чем заключается принцип применения протекторной защиты от коррозии? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов, протекающих при протекторной защите никеля в воде, содержащей кислород.

**366.** Два кусочка цинка одинаковой массы находятся в контакте с медью и свинцом в растворе соляной кислоты. Какой из них растворится быстрее? Напишите электронные уравнения анодного и катодного процессов, протекающих при коррозии. Составьте схемы образованных гальванических элементов.

**367.** Никелевую деталь покрыли свинцом. Какое это покрытие – катодное или анодное? Напишите электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этой детали во влажном воздухе при повреждении покрытия.

## КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

**368.** Определите, чему равны заряд комплексного иона, степень окисления и координационное число комплексообразователя в соединениях  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ ,  $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ ,  $\text{K}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$ . Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

**369.** Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений платины:  $\text{PtCl}_4 \cdot 6\text{NH}_3$ ,  $\text{PtCl}_4 \cdot 4\text{NH}_3$ ,  $\text{PtCl}_4 \cdot 2\text{NH}_3$ . Координационное число платины (+4) равно шести. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах. Какое из них является комплексным неэлектролитом?

**370.** Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений кобальта:  $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ ,  $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ ,  $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ . Координационное число кобальта (+3) равно шести. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

**371.** Определите, чему равны заряд комплексного иона, степень окисления и координационное число сурьмы в соединениях  $\text{Rb}[\text{SbBr}_6]$ ,  $\text{K}[\text{SbCl}_6]$ ,  $\text{Na}[\text{Sb}(\text{SO}_4)_2]$ . Как диссоциируют эти соединения в водных растворах?

**372.** Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений серебра:  $\text{AgCl} \cdot 2\text{NH}_3$ ,  $\text{AgCN} \cdot \text{KCN}$ ,  $\text{AgNO}_2 \cdot \text{NaNO}_2$ . Координационное число серебра (+1) равно двум. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

**373.** Определите, чему равны заряд комплексного иона, степень окисления и координационное число комплексообразователя в соединениях  $K_4[Fe(CN)_6]$ ,  $K_4[TiCl_8]$ ,  $K_2[HgI_4]$ . Как диссоциируют эти соединения в водных растворах?

**374.** Из сочетания частиц  $Co^{3+}$ ,  $NH_3$ ,  $NO_2^-$  и  $K^+$  можно составить семь координационных формул комплексных соединений кобальта, одна из которых  $[Co(NH_3)_6](NO_2)_3$ . Составьте формулы других шести соединений и напишите уравнения их диссоциации в водных растворах.

**375.** Определите, чему равен заряд следующих комплексных ионов:  $[Cr(H_2O)_4Cl_2]$ ,  $[HgBr_4]$ ,  $[Fe(CN)_6]$ , если комплексообразователями являются  $Cr^{3+}$ ,  $Hg^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$ . Напишите формулы соединений, содержащих эти комплексные ионы.

**376.** Определите, чему равен заряд комплексных ионов:  $[Cr(NH_3)_5NO_3]$ ,  $[Pd(NH_3)Cl_3]$ ,  $[Ni(CN)_4]$ , если комплексообразователями являются  $Cr^{3+}$ ,  $Pd^{2+}$ ,  $Ni^{2+}$ . Напишите формулы комплексных соединений, содержащих эти ионы.

**377.** Из сочетания частиц  $Cr^{3+}$ ,  $H_2O$ ,  $Cl^-$  и  $K^+$  можно составить семь координационных формул комплексных соединений хрома, одна из которых  $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ . Составьте формулы других шести соединений и напишите уравнения их диссоциации в водных растворах.

**378.** Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений кобальта:  $3NaNO_2 \cdot Co(NO_2)_3$ ,  $CoCl_3 \cdot 3NH_3 \cdot 2H_2O$ ,  $2KNO_2 \cdot NH_3 \cdot Co(NO_2)_3$ . Координационное число кобальта (+3) равно шести. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

**379.** Напишите выражения для констант нестойкости комплексных ионов  $[Ag(NH_3)_2]^+$ ,  $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ,  $[PtCl_6]^{2-}$ . Чему равны степень окисления и координационное число комплексообразователей в этих ионах?

**380.** Константы нестойкости комплексных ионов  $[Co(CN)_4]^{2-}$ ,  $[Hg(CN)_4]^{2-}$ ,  $[Cd(CN)_4]^{2-}$  соответственно равны  $8 \cdot 10^{-20}$ ,  $4 \cdot 10^{-41}$ ,  $1,4 \cdot 10^{-17}$ . В каком растворе, содержащем эти ионы (при равной молярной концентрации), ионов  $CN^-$  больше? Напишите выражения для констант нестойкости указанных комплексных ионов.

**381.** Напишите выражения для констант нестойкости следующих комплексных ионов:  $[Ag(CN)_2]^-$ ,  $[Ag(NH_3)_2]^+$ ,  $[Ag(NCS)_2]^-$ . Зная, что они соответственно равны  $1,0 \cdot 10^{-21}$ ,  $6,8 \cdot 10^{-8}$ ,  $2,0 \cdot 10^{-11}$ , укажите, в каком растворе, содержащем эти ионы (при равной молярной концентрации), больше ионов  $Ag^+$ .

**382.** При прибавлении раствора  $KCN$  к раствору  $[Zn(NH_3)_4]SO_4$  образуется растворимое комплексное соединение  $K_2[Zn(CN)_4]$ . Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции. Константа нестойкости какого иона:  $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$  или  $[Zn(CN)_4]^{2-}$  больше? Почему?

**383.** Напишите уравнения диссоциации солей  $K_3[Fe(CN)_6]$  и  $NH_4Fe(SO_4)_2$  в водном растворе. К каждой из них прилили раствор щелочи. В каком случае выпадает осадок гидроксида железа? Напишите молекулярное и

ионные уравнения реакции. Какие комплексные соединения называются двойными солями?

**384.** Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений платины (+2), координационное число которой равно четырем:  $\text{PtCl}_2 \cdot 3\text{NH}_3$ ,  $\text{PtCl}_2 \cdot \text{NH}_3 \cdot \text{KCl}$ ,  $\text{PtCl}_2 \cdot 2\text{NH}_3$ . Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах. Какое из них является комплексным неэлектролитом?

**385.** Хлорид серебра растворяется в растворах аммиака и тиосульфата натрия. Дайте этому объяснение и напишите молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций.

**386.** Какие комплексные соединения называются двойными солями? Напишите уравнения диссоциации солей  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN}_6)]$  и  $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$  в водном растворе. В каком случае выпадает осадок гидроксида железа, если к каждой из них прилить раствор щелочи? Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции.

**387.** Константы нестойкости комплексных ионов  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ,  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ,  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  соответственно равны  $6,2 \cdot 10^{-36}$ ;  $1,0 \cdot 10^{-37}$ ;  $1,0 \cdot 10^{-44}$ . Какой из этих ионов является более прочным? Напишите выражения для констант нестойкости указанных комплексных ионов и формулы соединений, содержащих эти ионы.

**388.** Гидроксиды меди и цинка растворяются в аммиаке. Объясните причину растворения осадков, написав уравнение реакции в молекулярной и ионно-молекулярной форме.

**389.** Напишите координационные формулы кристаллогидратов  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  и  $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , если координационные числа  $\text{Cu}^{2+}$  и  $\text{Ni}^{2+}$  соответственно равны 4 и 6. Приведите уравнения диссоциации этих соединений в водном растворе.

**390.** Гидроксиды хрома и цинка растворяются в избытке щелочи. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций, уравнения диссоциации полученных соединений в водном растворе и выражение константы нестойкости.

**391.** Составьте две координационные формулы для соединений состава  $\text{CoClSO}_4 \cdot 5\text{NH}_3$ , если известно, что одно из них, реагируя с нитратом серебра, дает осадок хлорида серебра, а другое, реагируя с нитратом бария, дает осадок сульфата бария. Координационное число  $\text{Co}^{3+}$  равно 6. Напишите уравнение взаимодействия этих веществ и уравнения диссоциации их в водных растворах.

**392.** Напишите формулы комплексных соединений кадмия, если лигандами являются молекулы аммиака, ионы  $\text{CN}^-$ , а координационное число кадмия равно 6.

## ЭЛЕМЕНТЫ (...ns<sup>1-2</sup>)

**393.** Какую степень окисления может проявлять водород в своих соединениях? Приведите примеры реакций, в которых газообразный водород играет роль окислителя, и в которых – роль восстановителя.

**394.** Напишите уравнения реакций натрия с водородом, кислородом, азотом и серой. Какую степень окисления приобретают атомы окислителя в каждой из этих реакций?

**395.** Напишите уравнения реакций с водой следующих соединений натрия:  $\text{Na}_2\text{O}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ,  $\text{NaH}$ ,  $\text{Na}_3\text{N}$ .

**396.** Как получают металлический натрий? Составьте электронные уравнения процессов, проходящих на электродах при электролизе расплава  $\text{NaOH}$ .

**397.** Какие свойства может проявлять пероксид водорода в окислительно-восстановительных реакциях? Почему? На основании электронных уравнений напишите уравнения реакций  $\text{H}_2\text{O}_2$ : а) с  $\text{Ag}_2\text{O}$ ; б) с  $\text{KI}$ .

**398.** Почему пероксид водорода способен диспропорционировать (самоокисляться – самовосстанавливаться)? Составьте электронные и молекулярные уравнения процесса разложения  $\text{H}_2\text{O}_2$ .

**399.** Как можно получить гидрид и нитрид кальция? Напишите уравнения реакций этих соединений с водой. К окислительно-восстановительным реакциям составьте электронные уравнения.

**400.** Назовите три изотопа водорода. Укажите состав их ядер. Что такое тяжелая вода? Как она получается и каковы ее свойства?

**401.** Гидроксид какого из s-элементов проявляет амфотерные свойства? Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций этого гидроксида: а) с кислотой; б) со щелочью.

**402.** При пропускании диоксида углерода через известковую воду (раствор  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) образуется осадок, который при дальнейшем пропускании  $\text{CO}_2$  растворяется. Дайте объяснение этому явлению. Составьте уравнения реакций.

**403.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) бериллия с раствором щелочи; б) магния с концентрированной серной кислотой, имея в виду максимальное восстановление последней.

**404.** При сплавлении оксид бериллия взаимодействует с диоксидом кремния и с оксидом натрия. Напишите уравнения соответствующих реакций. О каких свойствах  $\text{BeO}$  говорят эти реакции?

**405.** Какие соединения магния и кальция применяются в качестве вяжущих строительных материалов? Чем обусловлены их вяжущие свойства?

**406.** Как можно получить карбид кальция? Что образуется при его взаимодействии с водой? Напишите уравнения соответствующих реакций.

**407.** Как можно получить гидроксиды щелочных металлов? Почему едкие щелочи необходимо хранить в хорошо закрытой посуде? Составьте

уравнения реакций, происходящих при насыщении едкого натра: а) хлором; б) сернистым ангидридом; в) сероводородом.


**408.** Чем можно объяснить большую восстановительную способность щелочных металлов. При сплавлении едкого натра с металлическим натрием последний восстанавливает водород щелочи в гидрид-ион. Составьте электронные и молекулярные уравнения этой реакции.

**409.** Какое свойство кальция позволяет применять его в металлургии для получения некоторых металлов из их соединений? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций кальция: а) с  $V_2O_5$ ; б) с  $CaSO_4$ . В каждой из этих реакций окислитель восстанавливается максимально, приобретая низшую степень окисления.

**410.** Какие соединения называются негашеной и гашеной известью? Составьте уравнения реакций их получения. Какое соединение образуется при накаливании негашеной извести с углем? Что является окислителем и восстановителем в последней реакции? Составьте электронные и молекулярные уравнения.

**411.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) кальция с водой; б) магния с азотной кислотой, учитывая максимальное восстановление последней.

**412.** Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следующих превращений:



**413.** Напишите уравнение реакций для ряда превращений:  $ZnO \rightarrow Zn(NO_3)_2 \rightarrow Zn(OH)_2 \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] \rightarrow ZnCl_2 \rightarrow ZnOHCl \rightarrow Zn(OH)_2$ .

**414.** Напишите уравнения реакций для ряда превращений:



**415.** Напишите уравнения реакций взаимодействия металлического кальция со следующими веществами: с  $O_2$ ; с  $H_2O$ ; с  $H_2$ ; с  $N_2$ ; с  $HNO_3$  (разб) и  $HNO_3$  (конц).

**416.** Что образуется при действии  $Cl_2$  на сухой дигидроксид кальция? Напишите уравнение получения этого вещества и взаимодействие его с диоксидом углерода во влажном воздухе?

**417.** Как изменяется растворимость и основные свойства в ряду гидроксидов:  $Be(OH)_2 \rightarrow Ra(OH)_2$ . Объяснение дайте на основании электронного строения атомов элементов.

## ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ И МЕТОДЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ

**Пример 1.** Вычислить жесткость воды, зная, что в 500 л ее содержится 202,5 г  $Ca(HCO_3)_2$ .

**Решение.** В 1 л воды содержится  $202,5:500 = 0,405$  г  $Ca(HCO_3)_2$ , что составляет  $0,405:81=0,005$  моль, или 5 ммоль (81 г/моль—эквивалентная

масса  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ). Следовательно, жесткость воды 5 ммоль/л.

**Пример 2.** Сколько граммов  $\text{CaSO}_4$  содержится в 1 м<sup>3</sup> воды, если жесткость, обусловленная присутствием этой соли, равна 4 ммоль/л?

**Решение.** Молекулярная масса  $\text{CaSO}_4$  136,14 г/моль; эквивалентная масса равна половине молекулярной массы, т. е. 68,07 г/моль, а миллимоль эквивалентов 68,07 мг. В 1 м<sup>3</sup> воды с жесткостью 4 ммоль/л содержится  $4 \cdot 1000 = 4000$  ммоль, или  $4000 \cdot 68,07 = 272280$  мг = 272,290 г  $\text{CaSO}_4$

**Пример 3.** Сколько граммов соды надо прибавить к 500 л воды, чтобы устранить ее жесткость, равную 5 ммоль/л?

**Решение.** В 500 л воды содержится  $500 \cdot 5 = 2500$  ммоль, или 2,5 моль/л солей, обуславливающих жесткость воды. Для устранения жесткости следует прибавить  $2,5 \cdot 53 = 132,5$  г соды ( $M_3(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 53$  г/моль).

**Пример 4.** Вычислить карбонатную жесткость воды, зная, что на титрование 100 см<sup>3</sup> этой воды, содержащей гидрокарбонат кальция, потребовалось 6,25 см<sup>3</sup> 0,08 н. раствора  $\text{HCl}$ .

**Решение.** Вычисляем нормальность раствора гидрокарбоната кальция. Обозначив число эквивалентных масс растворенного вещества в 1 л раствора, т. е. нормальность, через  $x$ , составляем пропорцию:

$$6,25/100 = x/0,08, \quad x = 0,005 \text{ ммоль/л.}$$

Таким образом, в 1 л исследуемой воды содержится  $0,005 \cdot 1000 = 5$  ммоль гидрокарбоната кальция или 5 ммоль  $\text{Ca}^{2+}$ -ионов. Карбонатная жесткость воды 5 ммоль/л.

Приведенные примеры решают, используя формулу

$$Ж = m/M_3V,$$

где  $m$  – масса вещества, обуславливающего жесткость воды или применяемого для устранения жесткости воды, мг;  $M_3$  – эквивалентная масса этого вещества;  $V$  – объем воды, л.

*Решение примера 1.*

$$Ж = m/M_3V = 202500/81 \cdot 500 = 5 \text{ ммоль/л.}$$

81 – молярная масса эквивалента  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ , равная половине его молекулярной массы.

*Решение примера 2.*

$$\text{Из формулы } Ж = m/M_3V = 4 \cdot 68,07 \cdot 1000 = 272280 \text{ мг} = 272,280 \text{ г } \text{CaSO}_4.$$

**418.** Сколько граммов  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  надо прибавить к 500 л воды, чтобы устранить ее карбонатную жесткость, равную 5 ммоль/л?

**419.** Какие соли обуславливают жесткость природной воды? Какую жесткость называют карбонатной, некарбонатной? Как можно устранить карбонатную, некарбонатную жесткость? Напишите уравнения соответствующих реакций.

**420.** Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что для реакции с гидрокарбонатом кальция, содержащимся в  $200 \text{ см}^3$  воды, требуется  $15 \text{ см}^3 0,08 \text{ н}$  раствора  $\text{HCl}$ .

**421.** В  $1 \text{ л}$  воды содержится  $36,47 \text{ ммоль/л}$  ионов магния и  $50,1 \text{ ммоль/л}$  ионов кальция. Чему равна жесткость этой воды?

**422.** Сколько граммов карбоната натрия надо прибавить к  $400 \text{ л}$  воды, чтобы устранить жесткость, равную  $3 \text{ ммоль/л}$ ?

**423.** Вода, содержащая только сульфат магния, имеет жесткость  $7 \text{ ммоль/л}$ . Сколько граммов сульфата магния содержится в  $300 \text{ л}$  этой воды?

**424.** Вычислите жесткость воды, зная, что в  $600 \text{ л}$  ее содержится  $65,7 \text{ г}$  гидрокарбоната магния и  $61,2 \text{ г}$  сульфата кальция.

**425.** В  $220 \text{ л}$  воды содержится  $11 \text{ г}$  сульфата магния. Чему равна жесткость этой воды?

**426.** Жесткость воды, в которой растворен только гидрокарбонат кальция, равна  $4 \text{ ммоль/л}$ . Сколько  $0,1 \text{ н}$  раствора  $\text{HCl}$  потребуется для реакции с гидрокарбонатом кальция, содержащимся в  $75 \text{ см}^3$  этой воды?

**427.** В  $1 \text{ м}^3$  воды содержится  $140 \text{ г}$  сульфата магния. Вычислите жесткость этой воды.

**428.** Вода, содержащая только гидрокарбонат магния, имеет жесткость  $3,5 \text{ ммоль/л}$ . Сколько граммов гидрокарбоната магния содержится в  $200 \text{ л}$  этой воды?

**429.** К  $1 \text{ м}^3$  жесткой воды прибавили  $132,5 \text{ г}$  карбоната натрия. На сколько миллимолей эквивалентов понизилась жесткость?

**430.** Чему равна жесткость воды, если для ее устранения к  $50 \text{ л}$  воды потребовалось прибавить  $21,2 \text{ г}$  карбоната натрия?

**431.** Сколько граммов  $\text{CaSO}_4$  содержится в  $200 \text{ л}$  воды, если жесткость, обуславливаемая этой солью, равна  $8 \text{ ммоль/л}$ ?

**432.** Вода, содержащая только гидрокарбонат кальция, имеет жесткость  $9 \text{ ммоль/л}$ . Сколько граммов гидрокарбоната кальция содержится в  $500 \text{ л}$  этой воды?

**433.** Какие ионы надо удалить из природной воды, чтобы сделать ее мягкой? Введением каких ионов можно умягчить воду? Составьте уравнения соответствующих реакций.

**434.** Сколько граммов карбоната натрия надо прибавить к  $0,1 \text{ м}^3$  воды, чтобы устранить жесткость, равную  $4 \text{ ммоль/л}$ ?


**435.** К  $100 \text{ л}$  жесткой воды прибавили  $12,95 \text{ г}$  гидроксида кальция. На сколько  $\text{ммоль/л}$  понизилась карбонатная жесткость?

**436.** Чему равна карбонатная жесткость воды, если в  $1 \text{ л}$  ее содержится  $0,292 \text{ г}$  гидрокарбоната магния и  $0,2025 \text{ г}$  гидрокарбоната кальция?

**437.** Сколько граммов гидроксида кальция надо прибавить к  $275 \text{ л}$  воды, чтобы устранить ее карбонатную жесткость, равную  $5,5 \text{ ммоль/л}$ ?

## р-ЭЛЕМЕНТЫ (... ns<sup>2</sup> pn<sup>1-6</sup>)


**438.** Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следующих превращений



**439.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) алюминия с раствором щелочи; б) бора с концентрированной азотной кислотой.

**440.** Какой процесс называется алюмотермией? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции, на которой основано применение термита.

**441.** Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следующих превращений:



Уравнение окислительно-восстановительной реакции составьте на основании электронных уравнений.

**442.** Какая степень окисления наиболее характерна для олова и какая для свинца? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций олова и свинца с концентрированной азотной кислотой.

**443.** Чем можно объяснить восстановительные свойства соединений олова (+2) и окислительные свинца (+4)? На основании электронных уравнений составьте уравнения реакций: а)  $\text{SnCl}_2$  с  $\text{HgCl}_2$ ; б)  $\text{PbO}_2$  с  $\text{HCl}$  (конц.).

**444.** Какие оксиды и гидроксиды образуют олово и свинец? Как изменяются их кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства в зависимости от степени окисления элементов? Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций взаимодействия раствора едкого натра: а) с оловом; б) с дигидроксидом свинца.

**445.** Какие соединения называются карбидами и силицидами? Напишите уравнения реакций: а) карбида алюминия с водой; б) силицида магния с соляной кислотой. Являются ли эти реакции окислительно-восстановительными? Почему?

**446.** На основании электронных уравнений составьте уравнение реакции фосфора с азотной кислотой, учитывая, что фосфор окисляется максимально, а азот восстанавливается минимально.

**447.** Почему атомы большинства р-элементов способны к реакциям диспропорционирования (самоокисления – самовосстановления)? На основании электронных уравнений напишите уравнение реакции растворения серы в концентрированном растворе щелочи. Один из продуктов содержит серу со степенью окисления +4.

**448.** Почему сернистая кислота может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства? На основании электронных уравнений составьте уравнения реакций  $\text{H}_2\text{SO}_3$ : а) с сероводородом; б) с хлором.

**449.** Как проявляет себя сероводород в окислительно-восстановительных реакциях? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций взаимодействия раствора сероводорода: а) с хлором; б) с кислородом.

**450.** Почему азотистая кислота может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства? На основании электронных уравнений составьте уравнения реакций  $\text{HNO}_2$ : а) с бромной водой; б) с  $\text{HI}$ .

**451.** Почему диоксид азота способен к реакциям самоокисления – самовосстановления (диспропорционирования)? На основании электронных уравнений напишите уравнение реакции растворения  $\text{NO}_2$  в едком натре.

**452.** Какие свойства в окислительно-восстановительных реакциях проявляет серная кислота? Напишите уравнения реакций взаимодействия разбавленной серной кислоты с магнием и концентрированной – с медью. Укажите окислитель и восстановитель.

**453.** В каком газообразном соединении азот проявляет свою низшую степень окисления? Напишите уравнения реакций получения этого соединения: а) при взаимодействии хлорида аммония с гидроксидом кальция; б) разложением нитрида магния водой.

**454.** Почему фосфористая кислота способна к реакциям самоокисления – самовосстановления (диспропорционирования)? На основании электронных уравнений составьте уравнение процесса разложения  $\text{H}_3\text{PO}_3$ , учитывая, что при этом фосфор приобретает минимальную и максимальную степень окисления.

**455.** В каком газообразном соединении фосфор проявляет свою низшую степень окисления? Напишите уравнения реакций: а) получения этого соединения при взаимодействии фосфида кальция с соляной кислотой; б) горения его в кислороде.

**456.** Какую степень окисления проявляют мышьяк, сурьма и висмут. Какая степень окисления является более характерной для каждого из них? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) мышьяка с концентрированной азотной кислотой; б) висмута с концентрированной серной кислотой.

**457.** Как изменяются окислительные свойства галогенов при переходе от фтора к йоду и восстановительные свойства их отрицательно заряженных ионов? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а)  $\text{Cl}_2 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} =$ ; б)  $\text{KI} + \text{Br}_2 =$ . Укажите окислитель и восстановитель.

**458.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции, происходящей при пропускании хлора через горячий раствор едкого кали. К какому типу окислительно-восстановительных процессов относится данная реакция?

**459.** Какие реакции нужно провести для осуществления следующих превращений:  $\text{NaCl} \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{KClO}_3$ . Уравнения окислительно-восстановительных реакций составьте на основании электронных уравнений.

**460.** К раствору, содержащему  $\text{SbCl}_3$  и  $\text{BiCl}_3$ , добавили избыток раствора едкого кали. Напишите молекулярные и ионные уравнения происходящих реакций. Какое вещество находится в осадке?

**461.** Чем существенно отличается действие разбавленной азотной кислоты на металлы от действия соляной и разбавленной серной кислот? Что является окислителем в первом случае, что – в двух других. Приведите примеры.


**462.** Напишите формулы и назовите кислородные кислоты хлора, укажите степень окисления хлора в каждой из них. Какая из этих кислот более сильный окислитель? На основании электронных уравнений закончите уравнение реакции  $\text{KI} + \text{NaOCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \dots$ . Хлор приобретает минимальную степень окисления.

**463.** Какие реакции нужно провести, имея азот и воду, чтобы получить нитрат аммония? Составьте уравнения соответствующих реакций.

**464.** Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:  $\text{Mg}_2\text{Si} \rightarrow \text{SiH}_4 \rightarrow \text{SiO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3$ . При каком превращении происходит окислительно-восстановительная реакция?

**465.** Какое применение находит кремний? Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:  $\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si} \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3$ . Окислительно-восстановительные реакции напишите на основании электронных уравнений.

**466.** Как получают диоксид углерода в промышленности и в лаборатории? Напишите уравнения соответствующих реакций и реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения:



**467.** Какие из солей угольной кислоты имеют наибольшее промышленное применение? Как получить соду исходя из металлического натрия, соляной кислоты, мрамора и воды? Почему в растворе соды лакмус приобретает синий цвет? Ответ подтвердите составлением уравнений соответствующих реакций.

**468.** Какие степени окисления характерны для бора? Напишите формулы метабората, тетрабората и бориды натрия. Закончите уравнение реакции:  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{HCl} \rightarrow$

**469.** Сколько диоксида серы пойдет на реакцию восстановления хрома (+6) в хром (+3) при восстановлении 2 940 кг  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  в кислой среде? Напишите уравнение реакции, составьте электронные уравнения. Произведите расчеты.

**470.** Удаление  $\text{NH}_3$  из сточных вод достигается окислением его  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{Br}_2$  или  $\text{KClO}_3$  (в щелочной среде). Составьте уравнения реакций  $\text{NH}_3$  с бромом (продукты:  $\text{N}_2$  и  $\text{HBr}$ ), бертолетовой солью (продукты: натриевая селитра, хлорид калия и вода). Какой из способов более безвреден в экологическом отношении.

**471.** Какие 3 рода солей образует  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ? Сколько г  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  нужно прибавить к раствору, содержащему 2 моль  $\text{H}_3\text{PO}_4$ , чтобы получить эти соли.




**472.** С какими из перечисленных соединений взаимодействует  $\text{HBr}$ :

а)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ; б)  $\text{PCl}_3$ ; в)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (конц.); г)  $\text{KI}$ ; д)  $\text{Mg}$ ; е)  $\text{KClO}_3$ ?


**473.** Напишите уравнения реакций, которые необходимо провести для осуществления следующих превращений:  
 $\text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ .

**474.** Оцените с экологической точки зрения возможность нейтрализации серной кислоты, содержащейся в сточных водах предприятий, с помощью  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  или  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . Напишите молекулярное и ионное уравнения реакций.

**475.** Закончить уравнения реакций и расставить коэффициенты:




**476.** Закончить уравнения реакций, методом электронного баланса расставить коэффициенты:



### d-ЭЛЕМЕНТЫ ( $\dots(n-1)d^{1-10} ns^{0-2}$ )


**477.** Серебро не взаимодействует с разбавленной серной кислотой, тогда как в концентрированной оно растворяется. Чем это можно объяснить? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующей реакции.

**478.** Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:



**479.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций цинка: а) с раствором едкого натра; б) с концентрированной серной кислотой, учитывая восстановление серы до нулевой степени окисления.

**480.** Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:



**481.** При постепенном прибавлении раствора  $\text{KI}$  к раствору  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  образующийся вначале осадок растворяется. Какое комплексное соединение при этом получается? Составьте молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций.

**482.** При постепенном прибавлении раствора аммиака к раствору сульфата кадмия образующийся вначале осадок основной соли растворяется.

Составьте молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций.

**483.** При сливании растворов нитрата серебра и цианида калия выпадает осадок, который легко растворяется в избытке KCN. Какое комплексное соединение при этом получается? Составьте молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций.

**484.** К какому классу соединений относятся вещества, полученные при действии избытка едкого натра на растворы  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{CdCl}_2$ ,  $\text{HgCl}_2$ ? Составьте молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций.

**485.** При действии на титан концентрированной соляной кислоты образуется трихлорид титана, а при действии азотной – осадок метатитановой кислоты. Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**486.** При растворении титана в концентрированной серной кислоте последняя восстанавливается минимально, а титан переходит в катион с максимальной степенью окисления. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции.

**487.** Какую степень окисления проявляют медь, серебро и золото в соединениях? Какая степень окисления наиболее характерна для каждого из них? Иодид калия восстанавливает ионы меди (+2) в соединения меди со степенью окисления +1. Составьте электронные и молекулярные уравнения взаимодействия KI с сульфатом меди.

**488.** Диоксиды титана и циркония при сплавлении взаимодействуют со щелочами. О каких свойствах оксидов говорят эти реакции? Напишите уравнения реакций между: а)  $\text{TiO}_2$  и  $\text{BaO}$ ; б)  $\text{ZrO}_2$  и  $\text{NaOH}$ . В первой реакции образуется метатитанат, а во второй – ортоцирконат соответствующих металлов.

**489.** На гидроксиды цинка и кадмия подействовали избытком растворов серной кислоты, едкого натра и аммиака. Какие соединения цинка и кадмия образуются в каждом из этих случаев? Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций.

**490.** Золото растворяется в царской водке и в селеновой кислоте, приобретая при этом максимальную степень окисления. Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**491.** В присутствии влаги и диоксида углерода медь окисляется и покрывается зеленым налетом. Как называется и каков состав образующегося соединения? Что произойдет, если на него подействовать соляной кислотой? Напишите уравнения соответствующих реакций. Окислительно-восстановительную реакцию составьте на основании электронных уравнений.

**492.** Кусок латуни обработали азотной кислотой. Раствор разделили на две части. К одной из них прибавили избыток раствора аммиака, к другой – избыток раствора щелочи. Какие соединения цинка и меди образуются при этом? Составьте уравнения соответствующих реакций.

**493.** Ванадий получают алюмотермическим или кальцийтермическим восстановлением ванадиевого ангидрида  $V_2O_5$ . Последний легко растворяется в щелочах с образованием метаванадатов. Напишите уравнения соответствующих реакций. Уравнения окислительно-восстановительных реакций составьте на основании электронных уравнений.

**494.** Азотная кислота окисляет ванадий до метаванадиевой кислоты. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции.

**495.** Какую степень окисления проявляет ванадий в соединениях? Составьте формулы оксидов ванадия, отвечающих этим степеням окисления. Как меняются кислотно-основные свойства оксидов ванадия при переходе от низшей к высшей степени окисления. Составьте уравнения реакций: а)  $V_2O_3$  с  $H_2SO_4$ ; б)  $V_2O_5$  с  $NaOH$ .

**496.** При внесении цинка в подкисленный серной кислотой раствор метаванадата аммония  $NH_4VO_3$  желтая окраска постепенно переходит в фиолетовую за счет образования сульфата ванадия (+2). Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции.

**497.** Хромит калия окисляется бромом в щелочной среде. Зеленая окраска раствора переходит в желтую. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции. Какие ионы обуславливают начальную и конечную окраску раствора?

**498.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) растворения молибдена в азотной кислоте; б) растворения вольфрама в щелочи в присутствии кислорода. Учтите, что молибден и вольфрам приобретает высшую степень окисления.

**499.** При сплавлении хромита железа  $Fe(CrO_2)_2$  с карбонатом натрия в присутствии кислорода, хром (+3) и железо (+2) окисляются и приобретают соответственно степень окисления +6 и +3. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции.

**500.** К подкисленному серной кислотой раствору дихромата калия прибавили порошок алюминия. Через некоторое время оранжевая окраска раствора стала зеленой. Составьте электронные и молекулярные уравнения происходящей реакции.

**501.** Хром получают алюмотермически из его оксида (+3), а вольфрам восстановлением вольфрамового ангидрида водородом. Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**502.** Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления превращений:  $Na_2Cr_2O_7 \rightarrow Na_2CrO_4 \rightarrow Na_2Cr_2O_7 \rightarrow CrCl_3$ .

Уравнение окислительно-восстановительной реакции напишите на основании электронных уравнений.

**503.** Марганец азотной кислотой окисляется минимально, а рений максимально. Какие соединения при этом получаются? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.


**504.** Хлор окисляет манганат калия. Какое соединение при этом

получается? Как меняется окраска раствора в результате этой реакции? Составьте электронные и молекулярные уравнения.

**505.** Как меняется степень окисления марганца при восстановлении  $\text{KMnO}_4$  в кислой, нейтральной и щелочной средах? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции между  $\text{KMnO}_4$  и  $\text{KNO}_2$  в нейтральной среде.


**506.** На основании электронных уравнений составьте уравнение реакции получения манганата калия сплавлением диоксида марганца с хлоратом калия в присутствии едкого кали. Хлорат восстанавливается максимально.

**507.** Почему диоксид марганца может проявлять и окислительные, и восстановительные свойства? Исходя из электронных уравнений, составьте уравнения реакций:



**508.** Для получения хлора в лаборатории смешивают диоксид марганца с хлоридом натрия в присутствии концентрированной серной кислоты. Составьте электронные и молекулярные уравнения этой реакции.

**509.** Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:



Уравнения окислительно-восстановительных реакций напишите на основании электронных уравнений.

**510.** Какую степень окисления проявляет железо в соединениях? Как можно обнаружить ионы  $\text{Fe}^{2+}$  и  $\text{Fe}^{3+}$  в растворе? Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций.

**511.** Чем отличается взаимодействие тригидроксидов кобальта и никеля с кислотами от взаимодействия тригидроксида железа с кислотами? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

**512.** Могут ли в растворе существовать совместно следующие вещества: а)  $\text{FeCl}_3$  и  $\text{SnCl}_2$ ; б)  $\text{FeSO}_4$  и  $\text{NaOH}$ ; в)  $\text{FeCl}_3$  и  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ? Составьте уравнения реакций.

**513.** Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления превращений:  $\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_3$ . Уравнения окислительно-восстановительных реакций напишите на основании электронных уравнений.

**514.** Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) растворения платины в царской водке; б) взаимодействия осмия с фтором. Платина окисляется до степени окисления +4, а осмий – до +8.

**515.** Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:



**516.** Феррат калия  $\text{K}_2\text{FeO}_4$  образуется при сплавлении  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  с калийной

селитрой  $\text{KNO}_3$  в присутствии  $\text{KOH}$ . Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции.

## ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. ПОЛИМЕРЫ

**517.** Напишите структурную формулу простейшей непредельной одноосновной карбоновой кислоты и уравнение реакции взаимодействия этой кислоты с метиловым спиртом. Составьте схему полимеризации образовавшегося продукта.

**518.** Как из карбида кальция и воды получить винилацетат, применив реакцию Кучерова? Напишите уравнения реакций. Составьте схему полимеризации винилацетата.

**519.** Какие соединения называют аминами? Составьте схему поликонденсации адипиновой кислоты и гексаметилендиамина. Назовите образовавшийся полимер.

**520.** Как можно получить винилхлорид, имея карбид кальция, хлорид натрия, серную кислоту и воду? Напишите уравнения соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации винилхлорида.

**521.** Полимером какого непредельного углеводорода является натуральный каучук? Напишите структурную формулу этого углеводорода. Как называют процесс превращения каучука в резину? Чем по строению и свойствам различаются каучук и резина?

**522.** Напишите уравнения реакций получения ацетилена, превращения ацетилена в ароматический углеводород. При взаимодействии какого вещества с ацетиленом образуется акрилонитрил? Составьте схему полимеризации акрилонитрила.

**523.** Напишите структурную формулу метакриловой кислоты. Какое соединение получается при взаимодействии ее с метиловым спиртом? Напишите уравнение реакции. Составьте схему полимеризации образующегося продукта.

**524.** Какие углеводороды называют диеновыми? Приведите пример. Какой общей формулой выражают состав диеновых углеводородов? Составьте схему полимеризации одного из диеновых углеводородов.

**525.** Какие соединения называют олефинами? Приведите пример.

**526.** Какими признаками должны характеризоваться вещества, вступающие в реакцию: а) полимеризации, б) поликонденсации.

**527.** Полимеризацией изобутилена получают высокомолекулярное вещество – полиизобутилен. Составьте уравнение реакции полимеризации изобутилена. Укажите структурное звено полимера.

**528.** Полиамидное волокно энант, отличающееся от капрона большей светостойкостью, получают из продукта поликонденсации аминоксантоновой кислоты  $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{COOH}$ . Составьте уравнение поликонденсации аминоксантоновой кислоты.

**529.** Масса макромолекулы, полученной в результате полимеризации, равна сумме масс образовавших ее молекул. Распространяется ли это утверждение на вещества, получаемые поликонденсацией? Ответ поясните.

**530.** Полиамидное волокно анид (нейлон) получают из продукта совместной поликонденсации гексаметилендиамина  $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$  и двухосновной адипиновой кислоты  $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ . Составьте уравнение реакции.

# Общая и неорганическая ХИМИЯ

Методические указания  
к выполнению контрольной работы по дисциплине «Общая и неорганическая  
химия»  
для студентов специальности 240502.65, 240302.65, 280201.65 заочной  
формы обучения

*Составили:* РЯБУХОВА Татьяна Олеговна

ОКИШЕВА Наталья Анатольевна

*Рецензент* Чадина В.В.

Редактор

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Научно-техническая библиотека СГТУ

Тел. 52-63-81, 52-56-01

<http://lib.sstu.ru>